

PIANO DI CURA

Pralsetinib

Pralsetinib è indicato in monoterapia per il trattamento in linee successive alla prima di pazienti adulti con cancro del polmone non a piccole cellule (NSCLC) in stadio avanzato positivo per la fusione del gene REarranged during Transfection (RET) non precedentemente trattati con un inibitore di RET.

1.	Centro prescrittore (Centro Spoke):	
2.	Centro HUB:	
3.	Iniziali Paziente:	
4.	Data di Nascita:	
5.	Diagnosi:	<input type="checkbox"/> Carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC)
6.	Istologia:	<input type="checkbox"/> Adenocarcinoma <input type="checkbox"/> Carcinoma squamocellulare <input type="checkbox"/> Carcinoma adenosquamoso <input type="checkbox"/> Carcinoma a grandi cellule <input type="checkbox"/> Carcinoma NOS
7.	Il paziente ha una diagnosi di malattia non resecabile?	<input type="checkbox"/> Sì
8.	Stadio della malattia:	<input type="checkbox"/> Localmente Avanzato <input type="checkbox"/> Metastatico
8.1	Se metastatico, presenza di metastasi cerebrali sintomatiche?	<input type="checkbox"/> No
9.	Fusione del gene RET:	<input type="checkbox"/> Positiva
10.	Indicare metodica di rilevazione della fusione RET:	<input type="checkbox"/> NGS <input type="checkbox"/> PCR <input type="checkbox"/> FISH
11.	Linee di terapia per malattia metastatica	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> ≥4
12.	Precedente trattamento con inibitori di RET nel setting metastatico:	<input type="checkbox"/> No
13.	Altri precedenti trattamenti effettuati:	<input type="checkbox"/> Terapia sistemica (neo)adiuvante <input type="checkbox"/> Chirurgia <input type="checkbox"/> Radioterapia <input type="checkbox"/> Nessun trattamento <input type="checkbox"/> Altro (specificare): _____
14.	Performance status secondo scala ECOG	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
15.	Funzionalità epatica:	<input type="checkbox"/> Normale <input type="checkbox"/> Compromessa (se compromissione moderata/severa blocca)
16.	Funzionalità renale:	<input type="checkbox"/> Normale <input type="checkbox"/> Compromessa (se compromissione <30ml/min blocca)
17.	Intervallo di QTcF prima dell'inizio terapia con pralsetinib:	<input type="checkbox"/> ≤470 ms
18.	Il paziente ha anamnesi positiva per sindrome del QT lungo o torsione di punta oppure con anamnesi familiare positiva per sindrome del QT lungo o polmonite clinicamente sintomatica?	<input type="checkbox"/> No
19.	Il paziente è stato valutato per l'inserimento in Trial Clinici disponibili in ambito della ROV	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> Non Eleggibile <input type="checkbox"/> Paziente non vuole partecipare a Trial

**UOC Oncologia nella figura professionale del Dott./Prof. _____ si assume la responsabilità in merito alla veridicità delle informazioni indicate.
Si raccomanda che vi sia evidenza della valutazione multidisciplinare dedicata in cartella clinica.**

Data _____

Data _____

Timbro e Firma Centro Spoke

Timbro e Firma Centro Hub

Valutazione Centro HUB: Eleggibile	SI	NO
Note del Centro HUB:		