



Argomento all'ordine del giorno	Esito della seduta della CTRF
<p><b>1. Individuazione dei Centri prescrittori:</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>ONCOEMATOLOGIA</u></b></p> <p><b>1.1. TECVAYLI – teclistamab</b> indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da mieloma multiplo recidivato e refrattario che abbiano ricevuto almeno tre precedenti terapie, compresi un agente immunomodulatore, un inibitore del proteasoma e un anticorpo anti-CD38, e che abbiano evidenziato progressione della malattia durante l'ultima terapia.</p> <p><b>1.2. INAQOVI – decitabina/cedazuridina</b> indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con leucemia mieloide acuta (AML, acute myeloid leukaemia) di nuova diagnosi non idonei alla chemioterapia di induzione standard.</p> <p><b>1.3. TEPKINLY – epcoritamab</b> indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) recidivato o refrattario, dopo due o più linee di terapia sistemica.</p>	<p>1.1. La CTRF conclude la valutazione</p> <p>1.2. La CTRF conclude la valutazione</p> <p>1.3. La CTRF conclude la valutazione</p>
<p><b>2. Varie ed eventuali</b></p> <p><b>2.1. XARELTO – rivaroxaban</b> indicato in associazione ad ASA per la prevenzione di eventi aterotrombotici in pazienti adulti, ad alto rischio di eventi ischemici, che presentano arteriopatia periferica (Peripheral Artery Disease, PAD) sintomatica – modalità di prescrizione</p> <p><b>2.2. Gruppo di Lavoro (GdL) dedicato all'attuazione delle disposizioni relative all'erogazione dei medicinali e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche</b> (Decreto del Direttore DFPDM n. 49/2020): aggiornamento</p>	<p>2.1. La CTRF prende atto.</p> <p>2.2. La CTRF conclude la valutazione.</p>