



Argomento all'ordine del giorno	Esito della seduta della CTRF
1. GdL Farmaci oncoematologici: Report di HTA sui farmaci venetoclax e acalabrutinib per il trattamento della leucemia linfatica cronica (LLC)	1. la CTRF conclude la valutazione.
2. Individuazione Centri prescrittori 2.1 TECARTUS - Cellule CD3+ autologhe trasdotte anti-CD19 indicato per il trattamento di pazienti adulti con linfoma a cellule mantellari (mantle cell lymphoma, MCL) recidivante o refrattario dopo due o più linee di terapia sistemica che includano un inibitore della tirosin chinasi di Bruton (Bruton's tyrosine kinase, BTK) 2.2 LYNPARZA - Olaparib indicato, in monoterapia, per il trattamento di pazienti adulti con cancro della prostata metastatico resistente alla castrazione e con mutazioni nei geni BRCA1/2 (mutazione nella linea germinale e/o mutazione somatica), in progressione dopo precedente trattamento che includeva un nuovo agente ormonale 2.3 LYNPARZA - Olaparib in associazione con bevacizumab è indicato per il: trattamento di mantenimento di pazienti adulte con cancro epiteliale dell'ovaio di alto grado avanzato (stadi III e IV secondo FIGO), cancro della tuba di Falloppio o cancro peritoneale primitivo, in risposta (completa o parziale) dopo completamento della chemioterapia di prima linea a base di platino in associazione con bevacizumab e il cui tumore presenti un deficit di ricombinazione omologa (homologous recombination deficiency, HRD), definito dalla presenza di una mutazione BRCA1/2 e/o di instabilità genomica 2.4 BAVENCIO - Avelumab indicato in monoterapia per il trattamento di mantenimento di prima linea di pazienti adulti affetti da carcinoma uroteliale (urothelial carcinoma, UC) localmente avanzato o metastatico senza progressione dopo chemioterapia a base di platino 2.5 OFEV - Nintedanib indicato negli adulti per il trattamento di malattie interstiziali polmonari (ILD) fibrosanti croniche con fenotipo progressivo 2.6 KAFTRIO - ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor in un regime di associazione con ivacaftor 150 mg compresse per il trattamento di adulti e adolescenti di età pari e superiore a 12 anni affetti da fibrosi cistica (FC) che hanno almeno una mutazione F508del nel gene CFTR Presa d'atto dei centri prescrittori 2.7 KALYDECO - ivacaftor indicato in un regime di associazione con ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor	2.1 la CTRF conclude la valutazione; 2.2 la CTRF conclude la valutazione; 2.3 la CTRF conclude la valutazione; 2.4 la CTRF conclude la valutazione; 2.5 la CTRF conclude la valutazione; 2.6 la CTRF conclude la valutazione; 2.7 la CTRF conclude la valutazione.



compresse per il trattamento della fibrosi cistica (FC) in pazienti di età pari e superiore a dodici anni che hanno almeno una mutazione F508del nel gene regolatore della conduttanza transmembrana della fibrosi cistica (CFTR)	
3. Modifica della scheda di prescrizione cartacea antibiotici ad alto costo - TENKASI - oritavancina indicato per il trattamento delle infezioni batteriche acute della pelle e della struttura cutanea (ABSSSI) negli adulti	3. la CTRF conclude la valutazione.
4. Indicazioni in merito all'aggiornamento degli elenchi di prodotti allergeni per immunoterapia specifica	4. la CTRF prende atto e termina la discussione.