



Argomento all'ordine del giorno	Esito della seduta della CTRF
<p>1. Individuazione Centri prescrittori</p> <p>1.1 XOSPATA - Gilterinib indicato come monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con leucemia mieloide acuta (LMA) recidivante o refrattaria che presentano una mutazione del gene FLT3</p> <p>1.2 PERJETA - Pertuzumab indicato in associazione con trastuzumab e chemioterapia nel trattamento adiuvante di pazienti adulti con carcinoma mammario HER2 positivo allo stadio iniziale ad alto rischio di recidiva</p> <p>1.3 MABTHERA - Rituximab Linfoma non-Hodgkin (LNH) - in associazione a chemioterapia e' indicato per il trattamento di pazienti pediatrici (di eta' compresa tra \geq 6 mesi e $<$ 18 anni) con linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) CD20 positivo, linfoma di Burkitt (BL)/leucemia di Burkitt (leucemia acuta a cellule B mature; BAL) o linfoma simil-Burkitt (BLL) in stadio avanzato precedentemente non trattato.</p> <p>1.4 DUPIXENT - Dupilumab indicato come terapia aggiuntiva a corticosteroidi intranasali per il trattamento di adulti con CRSwNP grave per i quali la terapia con corticosteroidi sistemici e/o la chirurgia non fornisce un controllo adeguato della malattia</p>	<p>1.1 la CTRF conclude la valutazione; 1.2 la CTRF conclude la valutazione; 1.3 la CTRF conclude la valutazione; 1.4 la CTRF conclude la valutazione.</p>