



Argomento all'ordine del giorno	Esito della seduta della CTRF
<p>1. GdL Farmaci oncoematologici:</p> <p>1.1 Report di HTA: farmaci per il trattamento del Mieloma Multiplo (MM)</p> <p>1.2 Protocollo "The ReMM Study: Real-world Evidence on Multiple Mieloma in the Veneto Region"</p>	<p>1.1 la CTRF conclude la valutazione;</p> <p>1.2 la CTRF prende atto e prosegue la discussione.</p>
<p>2. Individuazione Centri prescrittori</p> <p>2.1 EVRYSDI - risdiplam indicato per il trattamento dell'atrofia muscolare spinale (SMA) 5q in pazienti a partire da due mesi di età, con una diagnosi clinica di SMA di tipo 1, tipo 2 o tipo 3 o aventi da una a quattro copie di SMN2</p> <p>2.2 KEYTRUDA - pembrolizumab indicato nel trattamento di prima linea del carcinoma metastatico del colon-retto con elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H, microsatellite instability-high) o con deficit di riparazione del mismatch (dMMR, mismatch repair deficient) negli adulti</p> <p>2.3 LONSURF - trifluridina indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma gastrico metastatico incluso l'adenocarcinoma della giunzione gastroesofagea, che sono stati precedentemente trattati con almeno due precedenti regimi di trattamento sistemico per malattia avanzata</p> <p>2.4 DUPIXENT - dupilumab indicato per il trattamento della dermatite atopica severa nei bambini di età compresa tra 6 e 11 anni eleggibili per la terapia sistemica</p>	<p>2.1 la CTRF conclude la valutazione;</p> <p>2.2 la CTRF conclude la valutazione;</p> <p>2.3 la CTRF conclude la valutazione;</p> <p>2.4 la CTRF conclude la valutazione.</p>
<p>3. GdL per la profilassi e il trattamento del tromboembolismo venoso (TEV):</p> <p>Documento di indirizzo e valutazione HTA sui farmaci per la profilassi e il trattamento del tromboembolismo (TEV)</p>	<p>3. la CTRF conclude la valutazione e termina la discussione.</p>