



Argomento all'ordine del giorno	Esito della seduta della CTRF
<p>1. Individuazione Centri prescrittori</p> <p>1.1 NUBEQA - darolutamide trattamento degli uomini adulti con carcinoma prostatico non metastatico resistente alla castrazione (nmCRPC) che sono ad alto rischio di sviluppare malattia metastatica</p> <p>1.2 REVLIMID - lenalidomide in regime terapeutico di associazione con desametasone, o bortezomib e desametasone, o melfalan e prednisone è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo non precedentemente trattato che non sono eleggibili al trapianto</p> <p>1.3 REVLIMID - lenalidomide in associazione con rituximab (anticorpo anti-CD20) è indicato per il trattamento dei pazienti adulti con linfoma follicolare (grado 1-3a) precedentemente trattato</p> <p>1.4 REVESTIVE - Teduglutide indicato per il trattamento di pazienti di 1 anno di età e oltre affetti da sindrome dell'intestino corto (SBS). I pazienti devono essere in condizioni stabili dopo un periodo di adattamento dell'intestino a seguito dell'intervento</p> <p>1.5 WAYLIVRA - Volanesorsen indicato come coadiuvante della dieta in pazienti adulti affetti da sindrome da chilomicronemia familiare (FCS) confermata geneticamente e ad alto rischio di pancreatite, in cui la risposta alla dieta e alla terapia di riduzione dei trigliceridi è stata inadeguata</p>	<p>1.1 la CTRF conclude la valutazione; 1.2 la CTRF conclude la valutazione; 1.3 la CTRF conclude la valutazione; 1.4 la CTRF conclude la valutazione; 1.5 la CTRF conclude la valutazione.</p>
<p>2. Aggiornamento scheda di prescrizione cartacea</p> <p>2.1 ZAVICEFTA - ceftazidima, associazioni indicato per il trattamento delle seguenti infezioni negli adulti: infezione intra-addominale complicata (cIAI); infezione complicata del tratto urinario (cUTI), inclusa pielonefrite; polmonite acquisita in ospedale (HAP), inclusa polmonite associata a ventilazione meccanica (VAP); «Zavicefta» e' inoltre indicato per il trattamento di infezioni causate da microrganismi Gram-negativi aerobi in pazienti adulti nei quali vi siano opzioni terapeutiche limitate.</p> <p>2.2 ZERBAXA - ceftolozano/tazobactam polmonite acquisita in ospedale (HAP), inclusa polmonite associata a ventilazione meccanica (VAP).</p>	<p>2.1 la CTRF conclude la valutazione; 2.2 la CTRF conclude la valutazione.</p>
<p>3. Documento di indirizzo sulla terapia farmacologica del diabete tipo 2</p>	<p>3. la CTRF conclude la discussione.</p>