



Argomento all'ordine del giorno	Esito della seduta della CTRF
<p>1. Gruppo ROV farmaci innovativi</p> <p>1.1 Farmaci per melanoma adiuvante e metastatico: estensione ai centri Spoke con piano di cura dedicato;</p> <p>1.2 Durvalumab per NSLC localmente avanzato: proposta di somministrazione ai centri Spoke previa indicazione del gruppo multidisciplinare del centro HUB e conseguente apertura registro AIFA del centro Spoke;</p>	<p>1.1 la CTRF conclude la discussione;</p> <p>1.2 la CTRF conclude la discussione.</p>
<p>2. Individuazione Centri prescrittori</p> <p>2.1 ALUNBRIG – Brigatinib indicata in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con cancro del polmone non a piccole cellule (NSCLC) positivo per la chinasi del linfoma anaplastico (ALK+) in stadio avanzato, precedentemente trattati con crizotinib.</p> <p>2.2 EMLICITI - Elotuzumab, indicato in combinazione con pomalidomide e desametasone per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo recidivato e refrattario che hanno ricevuto almeno due linee di terapia precedenti comprendenti lenalidomide e un inibitore del proteasoma e con progressione della terapia durante la malattia.</p> <p>2.3 VERKAZIA – Ciclosporina indicata per il trattamento di severa cheratocongiuntivite Vernal (VKC) nei bambini al di sopra di 4 anni e negli adolescenti.</p>	<p>2.1 la CTRF conclude la valutazione;</p> <p>2.2 la CTRF conclude la valutazione;</p> <p>2.3 la CTRF conclude la valutazione.</p>
<p>3. RACCOMANDAZIONI REV</p> <p>Leucemia Linfoblastica Acuta:</p> <ul style="list-style-type: none">- Blinatumomab (Blincyto): LLA da precursori delle cellule B, Ph-, CD19+, in prima o seconda remissione completa con malattia minima residua (MRD+) > 0,1%, in adulti;- Blinatumomab (Blincyto): Trattamento di adulti con leucemia linfoblastica acuta (LLA) da precursori delle cellule B recidivante o refrattaria negativa per il cromosoma Philadelphia (Ph-);- Inotuzumab Ozogamicin (Besponsa): Trattamento in monoterapia di pazienti adulti con leucemia linfoblastica acuta (LLA) da precursori delle cellule B CD22-positivi, recidivante o refrattaria. I pazienti adulti con LLA da precursori delle cellule B, recidivante o refrattaria, positiva per il cromosoma Philadelphia (Ph+), devono aver fallito il trattamento con almeno un inibitore della tirosinchinasi (TKI)	<p>3. la CTRF conclude la discussione.</p>
<p>4. Varie ed eventuali</p> <p>4.1 Presentazione dati Rapporto Farmacovigilanza anno 2019</p> <p>4.2 Inserimento testosterone e farmaci estrogeni nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23</p>	<p>4.1 la CTRF prende atto;</p> <p>4.2 la CTRF conclude la valutazione;</p> <p>4.3 la CTRF conclude la valutazione.</p>

Area Sanità e Sociale

Direzione Farmaceutico-Protetica-Dispositivi medici

Rio Novo, Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia tel. 041. 2793412/3415/3406 - fax 041. 2793468
e-mail: assistenza.farmaceutica@regione.veneto.it PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
Cod. Fisc. 80007580279 P.IVA 02392630279



dicembre 1996, n. 648, per l'impiego nel processo di virilizzazione/femminilizzazione di transgender, previa diagnosi di disforia di genere/incongruenza di genere formulata da un'equipe multidisciplinare e specialistica dedicata.

4.3 Integrazione Centri prescrittori
- DGR 1451/2018: teriparatide