



Argomento all'ordine del giorno	Esito della seduta della CTRF
<p>1. Presentazione Rapporto Farmacovigilanza Anno 2020</p> <p>2. Individuazione Centri prescrittori</p> <p>2.1 Zejula - niraparib indicato come monoterapia per il trattamento di mantenimento di pazienti adulte con carcinoma ovarico epiteliale avanzato (stadio FIGO III e IV), carcinoma delle tube di Falloppio o carcinoma peritoneale primario, di grado elevato, che stiano rispondendo (risposta completa o parziale) alla chemioterapia di prima linea a base di platino</p> <p>2.2 Calquence - acalabrutinib - in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con leucemia linfocitica cronica (LLC) non trattata in precedenza. - in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con leucemia linfocitica cronica (LLC) che hanno ricevuto almeno una precedente terapia.</p> <p>2.3 Darzalex - daratumumab indicato in associazione con bortezomib, talidomide e desametasone per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo di nuova diagnosi eleggibili al trapianto autologo di cellule staminali</p> <p>2.4 Blenrep - belantamab mafodotin indicato in monoterapia per il trattamento del mieloma multiplo nei pazienti adulti, che hanno ricevuto almeno quattro terapie precedenti e la cui malattia risulta refrattaria ad almeno un inibitore del proteasoma, un agente immunomodulatore e un anticorpo monoclonale anti-CD38 e che hanno mostrato progressione di malattia all'ultima terapia</p> <p>2.5 Reblozyl - luspatercept - indicato per il trattamento di pazienti adulti con anemia trasfusione-dipendente dovuta a sindrome mielodisplastica (SMD) a rischio molto basso, basso e intermedio, che presentano sideroblasti ad anello con risposta insoddisfacente o non idonei a terapia basata su eritropoietina; - indicato per il trattamento di pazienti adulti con anemia trasfusione-dipendente, associata a beta-talassemia</p> <p>2.6 Stelara - ustekinumab indicato per il trattamento di pazienti adulti con colite ulcerosa attiva di grado da moderato a grave che hanno avuto una risposta inadeguata, hanno perso la risposta o sono risultati intolleranti alla terapia convenzionale o ad una terapia biologica oppure che presentano controindicazioni mediche a tali terapie</p>	<p>1. la CTRF prende atto e prosegue la discussione;</p> <p>2.1 la CTRF conclude la valutazione; 2.2 la CTRF conclude la valutazione; 2.3 la CTRF conclude la valutazione; 2.4 la CTRF conclude la valutazione; 2.5 la CTRF conclude la valutazione; 2.6 la CTRF conclude la valutazione; 2.7 la CTRF conclude la valutazione.</p>



2.7 Tremfya - guselkumab da solo o in associazione a metotrexato (MTX), è indicato per il trattamento dell'artrite psoriasica attiva in pazienti adulti che hanno avuto una risposta inadeguata o che hanno mostrato intolleranza a una precedente terapia con farmaci antireumatici modificanti la malattia (DMARD).	
3. Schema per una proposta formativa sui farmaci della BPCO destinata ai MMG della Regione Veneto. - Presentazione proposta formativa relativa alla Nota AIFA n. 99, redatta a cura del GdL BPCO; - Presentazione protocollo di monitoraggio dei pazienti con BPCO a seguito dell'introduzione della Nota AIFA n. 99; - Revisione Elenco dei Centri autorizzati alla prescrizione dei Farmaci per la BPCO – NOTA 99.	3. la CTRF prende atto e prosegue la discussione.
4. Richiesta della Società Italiana di Neonatologia di riguardo la richiesta di inserimento 6° dose Synagis nel Piano Terapeutico	4. la CTRF conclude la valutazione.
5. Regione Veneto: Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per l'osteoporosi e le fratture da fragilità	4. la CTRF prende atto e prosegue la discussione.
6. Richieste di integrazione Centri Prescrittori iPCSK9 da parte dell'AULSS 2 Marca Trevigiana	5. la CTRF conclude la valutazione e termina la discussione.