



Argomento all'ordine del giorno	Esito della seduta della CTRF
<p>1. Insediamento della Commissione Tecnica Regionale Farmaci ed approvazione del calendario riunioni CTRF I semestre 2024</p>	<p>1. La CTRF conclude la valutazione.</p>
<p>2. Approvazione schede istruttorie ed individuazione Centri prescrittori:</p> <p>2.1. LIVAMRLI - maralixibat indicato per il trattamento del prurito colestatico in pazienti affetti da sindrome di Alagille (ALGS) di età pari e superiore a due mesi</p> <p>2.2. ONIVYDE PERYLATED LIPOSOMAL - irinotecano indicato per il trattamento dell'adenocarcinoma metastatico del pancreas, in associazione con 5-fluorouracile (5-FU) e leucovorin (LV), in pazienti adulti in progressione dopo una terapia a base di gemcitabina</p> <p>2.3. ENHERTU - trastuzumab deruxtecan in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con cancro della mammella HER2-low non resecabile o metastatico, che hanno ricevuto precedente chemioterapia per malattia metastatica o che hanno sviluppato recidiva della malattia durante o entro sei mesi dal completamento della chemioterapia adiuvante</p> <p>2.4. ENHERTU - trastuzumab deruxtecan in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con adenocarcinoma dello stomaco o della giunzione gastroesofagea (GEJ) avanzato HER2-positivo, che hanno ricevuto un precedente regime a base di trastuzumab</p> <p>2.5. TEYSUNO - tegafur indicato negli adulti come monoterapia o in combinazione con oxaliplatino o irinotecan, con o senza bevacizumab, per il trattamento di pazienti con carcinoma colon-rettale metastatico per i quali non è possibile proseguire il trattamento con un'altra fluoropirimidina a causa di sindrome mano-piede o di tossicità cardiovascolare sviluppate in contesto adiuvante o metastatico</p> <p>2.6. ISTRUTTORIA LEUCEMIA LINFOBLASTICA ACUTA BLINCYTO - blinatumomab indicato in monoterapia per il trattamento di adulti con leucemia linfoblastica acuta (LLA) da precursori delle cellule B, recidivante o refrattaria, positiva per CD19. I pazienti con LLA da precursori delle cellule B positiva per il cromosoma Philadelphia devono non aver risposto al trattamento con almeno 2 inibitori della tirosin chinasi (TKI) e non</p>	<p>2.1. La CTRF conclude la valutazione. 2.2. La CTRF conclude la valutazione. 2.3. La CTRF conclude la valutazione. 2.4. La CTRF rimanda la valutazione. 2.5. La CTRF rimanda la valutazione. 2.6. La CTRF conclude la valutazione. 2.7. La CTRF conclude la valutazione.</p>



<p>devono avere opzioni di trattamento alternative</p> <p>TECARTUS - brexucabtagene autoleucel è indicato per il trattamento di pazienti adulti di età pari o superiore a ventisei anni con leucemia linfoblastica acuta (acute lymphoblastic leukaemia, ALL) a precursori di cellule B recidivante o refrattaria</p> <p>2.7. POLIVY- polatuzumab in associazione con rituximab, ciclofosfamide, doxorubicina e prednisone (R-CHP) è indicato per il trattamento di pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) non precedentemente trattato con fattore di indice prognostico (IPI) 3-5</p>	
<p>3. Aggiornamento dei Centri prescrittori dei farmaci VITRAKVI - larotrectinib e ROZLYTREK – entrectinib di cui al DDR n. 106 del 5.10.2021</p>	<p>3. La CTRF conclude la valutazione.</p>
<p>4. Presentazione del documento “Prescrizioni sicure negli Istituti Penitenziari del Veneto”</p>	<p>4. La CTRF rimanda la valutazione.</p>