



Argomento all'ordine del giorno	Esito della seduta della CTRF
1. Approvazione schede istruttorie sospese dalle precedenti sedute ed individuazione Centri prescrittori: 1.1. VYEPTI - eptinezumab indicato per la profilassi dell'emicrania negli adulti, con almeno quattro giorni di emicrania al mese 1.2. COSENTYX - secukinumab indicato: - da solo o in associazione con metotrexato (MTX), è indicato per il trattamento dell'artrite attiva correlata a entesite in pazienti di età pari o superiore a sei anni che hanno risposto in modo inadeguato, o non in grado di tollerare, la terapia convenzionale - da solo o in associazione con metotrexato (MTX), è indicato per il trattamento dell'artrite psoriasica giovanile attiva in pazienti di età pari o superiore a sei anni che hanno risposto in modo inadeguato, o non in grado di tollerare, la terapia convenzionale.	1.1. La CTRF conclude la valutazione. 1.2. La CTRF conclude la valutazione.
2. Approvazione schede istruttorie ed individuazione Centri prescrittori: 2.1. LIVTENCITY – maribavir indicato nel trattamento dell'infezione e/o della malattia da citomegalovirus (CMV) refrattaria (con o senza resistenza) a una o più terapie precedenti, tra cui ganciclovir, valganciclovir, cidofovir o foscarnet in pazienti adulti che hanno subito un trapianto di cellule staminali ematopoietiche (HSCT) o trapianto di organo solido (SOT) 2.2. OLUMIANT - baricitinib indicato nel trattamento dell'alopecia areata severa nei pazienti adulti 2.3. OLUMIANT - baricitinib indicato nel trattamento della dermatite atopica da moderata a severa in pazienti adulti che sono candidati ad una terapia sistemica. 2.4. RINVOQ - upadacitinib indicato nel trattamento di pazienti adulti affetti da colite ulcerosa attiva da moderata a severa che hanno avuto una risposta inadeguata, hanno perso la risposta o sono risultati intolleranti alla terapia convenzionale o a un agente biologico 2.5. KEYTRUDA – pembolizumab in monoterapia nel trattamento dei seguenti tumori MSI-H (alta instabilità dei microsatelliti) o dMMR (deficit del mismatch repair) negli adulti con carcinoma del colon-retto non resecabile o metastatico dopo precedente terapia di associazione a base di fluoropirimidina	2.1. La CTRF conclude la valutazione. 2.2. La CTRF conclude la valutazione. 2.3. La CTRF conclude la valutazione. 2.4. La CTRF conclude la valutazione. 2.5. La CTRF conclude la valutazione. 2.6. La CTRF conclude la valutazione. 2.7. La CTRF conclude la valutazione. 2.8. La CTRF conclude la valutazione. 2.9. La CTRF conclude la valutazione.



2.6. KEYTRUDA – pembolizumab in monoterapia nel trattamento dei seguenti tumori MSI-H (alta instabilità dei microsatelliti) o dMMR (deficit del mismatch repair) negli adulti con carcinoma gastrico, dell'intestino tenue o delle vie biliari, non resecabile o metastatico, con progressione della malattia durante o dopo almeno una precedente terapia 2.7. AMVUTTRA - vutrisiran indicato nel trattamento dell'amiloidosi ereditaria mediata dalla transtiretina (amiloidosi hATTR) in pazienti adulti affetti da polineuropatia allo stadio 1 o allo stadio 2 <u>Istruttoria Linfoma Follicolare (LF)</u> 2.8. KYMRIA - tisagenlecleucel indicato nel trattamento di pazienti adulti con linfoma follicolare (LF) in recidiva o refrattario dopo due o più linee di terapia sistemica 2.9. LONSUMIO - mosunetuzumab in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma follicolare (LF) recidivante o refrattario che sono stati sottoposti ad almeno due terapie sistemiche precedenti	
3. Richieste integrazione Centri prescrittori: - DDR n. 37/2017: farmaci di area oncologica	3. La CTRF conclude la valutazione.