



**COMMISSIONE TECNICA REGIONALE FARMACI
ORDINE DEL GIORNO
Seduta in Teleconferenza del 15.10.2024**

1. Aggiornamento sul farmaco BEYFORTUS® - nirsevimab indicato nella prevenzione della patologia del tratto respiratorio inferiore causata dal virus respiratorio sinciziale (VRS) nei neonati e nei bambini nella prima infanzia durante la loro prima stagione caratterizzata da VRS

Istruttoria: Direzione Farmaceutico Protesica Dispositivi Medici

2. Approvazione schede istruttorie ed individuazione Centri prescrittori:

MALATTIE RARE

2.1. HEMLIBRA – emicizumab indicato per la profilassi di routine degli episodi emorragici in pazienti affetti da emofilia A (deficit congenito di fattore VIII): senza inibitori del fattore VIII che presentano malattia moderata (FVIII \geq 1% e \leq 5%) con fenotipo emorragico severo

Istruttoria: UOC Governo Clinico - Azienda Zero

2.2. CEVENFACTA – eptacog beta è indicato adulti e adolescenti (a partire da dodici anni di età) per il trattamento di episodi emorragici e nella prevenzione di sanguinamenti durante gli interventi chirurgico procedure invasive nei seguenti gruppi di pazienti:

- Pazienti con emofilia congenita con inibitori ad alta risposta ai fattori di coagulazione VIII o IX (ad es. = 5 unità Bethesda[UB]);
- Pazienti con emofilia congenita con inibitori a basso titolo (UB < 5), ma nei quali è attesa un'alta risposta anamnestica alla somministrazione del fattore VIII o del fattore IX o refrattarietà all'incremento del dosaggio di FVIII o FIX

Istruttoria: UOC Governo Clinico - Azienda Zero

ONCOLOGIA

2.3. PHESGO – pertuzumab/trastuzumab indicato per l'uso in associazione con chemioterapia nel trattamento neoadiuvante di pazienti adulti con carcinoma mammario HER2 positivo, localmente avanzato, infiammatorio o allo stadio iniziale ad alto rischio di recidiva

Istruttoria: UOC Governo Clinico - Azienda Zero



AREA DERMATOLOGICA

2.4. SOTYKTU - deucravacitinib indicato per il trattamento della psoriasi a placche da moderata a severa in adulti candidati alla terapia sistemica

Istruttoria: UOC Governo Clinico - Azienda Zero

AREA GASTROENTEROLOGICA

2.5. OMVOH – mirikizumab indicato per il trattamento di pazienti adulti con colite ulcerosa attiva di grado da moderato a grave che hanno avuto una risposta inadeguata, hanno perso la risposta o sono risultati intolleranti alla terapia convenzionale o a un trattamento biologico

Istruttoria: UOC Governo Clinico – Azienda Zero

ALTRO

2.6. JARDIANCE – empagliflozin indicato negli adulti per il trattamento della malattia renale cronica

Istruttoria: UOC Governo Clinico – Azienda Zero

2.7. IDEFIRIX - imlifidase indicato per il trattamento di desensibilizzazione di pazienti adulti altamente sensibilizzati che necessitano di trapianto di rene con un crossmatch positivo contro un donatore deceduto disponibile – **rivalutazione scheda istruttoria sospesa**

Istruttoria: UOC Governo Clinico – Azienda Zero

3. Comunicazione relativa al farmaco EYLEA - aflibercept indicato per il trattamento negli adulti di:

- Degenerazione maculare neovascolare (essudativa) correlata all'età (Neovascular Age-related Macular Degeneration – nAMD);
- Compromissione della vista dovuta a edema maculare diabetico (Diabetic Macular Oedema – DME)

Comunicazione: Segreteria della CTRF

4. Presentazione del documento "Procedure regionali tecnico-operative per la corretta gestione delle terapie farmacologiche nei servizi per le dipendenze (Ser.D.) e servizi accreditati del privato sociale"

Istruttoria: Direzione Farmaceutico-Protetico-Dispositivi Medici

5. Gruppo di Lavoro (GdL) dedicato all'attuazione delle disposizioni relative all'erogazione dei medicinali e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche (Decreto del Direttore DFPDM n. 49/2020): approfondimento istruttorio



Istruttoria: Direzione Farmaceutico Protesica Dispositivi Medici

6. Varie ed eventuali