



**COMMISSIONE TECNICA REGIONALE FARMACI
ORDINE DEL GIORNO
Seduta in Teleconferenza del 28.10.2021**

1. Paracetamolo a carico SSN per il trattamento del dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa (extra – LEA). Proposta modifica DGR n. 239 del 4.2.2005

Parere Rete delle Cure Palliative in merito all'erogazione extra-LEA di paracetamolo per dolore oncologico
Istruttoria: Direzione Farmaceutico – Protesica – Dispositivi medici

2. Individuazione Centri prescrittori:

2.1 Rozlytrek – Entrectinib indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) in stadio avanzato ROS1+ non precedentemente trattati con inibitori di ROS1+;

Istruttoria: UOC HTA – Azienda Zero

2.2 Afinitor - Everolimus indicato per il trattamento di tumori neuroendocrini di origine gastrointestinale o polmonare: "Afinitor" e' indicato per il trattamento di tumori neuroendocrini di origine gastrointestinale o polmonare, ben differenziati (Grado 1 o Grado 2), non funzionanti, non operabili o metastatici, in progressione di malattia, negli adulti **(da confermare)**;

Istruttoria: UOC HTA – Azienda Zero

2.3 Kadcyla - trastuzumab emtansine in monoterapia, e' indicato per il trattamento adiuvante di pazienti adulti affetti da tumore mammario in stadio iniziale HER2-positivo con malattia invasiva residua a livello della mammella e/o dei linfonodi dopo terapia neoadiuvante a base di taxani e terapia mirata anti-HER2 **(da confermare)**;

Istruttoria: UOC HTA – Azienda Zero

2.4 Adcetris - Brentuximab Vedotin indicato per il trattamento del linfoma anaplastico a grandi cellule sistemico: "Adcetris" e' indicato in combinazione con ciclofosfamide, doxorubicina e prednisone (CHP) per pazienti adulti non precedentemente trattati affetti da linfoma anaplastico a grandi cellule sistemico (sALCL);

Istruttoria: UOC HTA – Azienda Zero



2.5 Adcetris - Brentuximab Vedotin indicato in combinazione con doxorubicina, vinblastina e dacarbazina (AVD) per pazienti adulti non precedentemente trattati affetti da linfoma di Hodgkin (HL) CD30+ in Stadio IV;

Istruttoria: UOC HTA – Azienda Zero

2.6 Sarclisa - Isatuximab indicato, in associazione a pomalidomide e desametasone, per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo (MM) recidivato e refrattario (RR) che hanno ricevuto almeno due terapie precedenti, tra cui lenalidomide e un inibitore del proteasoma (PI) e con progressione della malattia durante l'ultima terapia;

Istruttoria: UOC HTA – Azienda Zero

2.7 Tavlisse - Fostamatinib indicato per il trattamento della trombocitopenia immune (immune thrombocytopenia, ITP) cronica in pazienti adulti refrattari ad altri trattamenti;

Istruttoria: UOC HTA – Azienda Zero

2.8 Adempas - Riociguat Ipertensione polmonare tromboembolica cronica (chronic thromboembolic pulmonary hypertension, CTEPH). «Adempas» è indicato per il trattamento di pazienti adulti di classe funzionale (CF) OMS da II a III affetti da: CTEPH inoperabile; CTEPH persistente o recidivante dopo trattamento chirurgico; per migliorare la capacità di esercizio fisico. Ipertensione arteriosa polmonare (pulmonary arterial hypertension, PAH). «Adempas», come monoterapia o in combinazione con antagonisti del recettore dell'endotelina, è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da ipertensione arteriosa polmonare (PAH) con classe funzionale (CF) OMS da II a III per migliorare la capacità di esercizio fisico. L'efficacia è stata evidenziata in pazienti affetti da PAH idiopatica o ereditaria oppure PAH associata a patologie del tessuto connettivo;

Istruttoria: UOC HTA – Azienda Zero

2.9 Lokelma - ciclosilicato di sodio zirconio indicato per il trattamento dell'iperkaliemia nei pazienti adulti;

Istruttoria: UOC HTA – Azienda Zero

2.10 Veltassa - patiromer indicato per il trattamento dell'iperkaliemia;

Istruttoria: UOC HTA – Azienda Zero

3. Raccomandazioni GdL Farmaci Oncoematologici



Report HTA farmaco ADCETRIS (BRENTUXIMAB VEDOTIN) indicato in combinazione con ciclofosfamide, doxorubicina e prednisone (CHP) per adulti non precedentemente trattati affetti da linfoma anaplastico sistemico a grandi cellule (sALCL);

Istruttoria: UOC HTA – Azienda Zero

4. Revisione Criteri individuazione Centri prescrittori farmaci iPCSK9

Istruttoria: Direzione Farmaceutico – Protesica – Dispositivi medici

5. Presa d’atto delle richieste di integrazione centri prescrittori

Istruttoria: Direzione Farmaceutico – Protesica – Dispositivi medici

6. Varie ed eventuali