



COMMISSIONE TECNICA REGIONALE FARMACI ORDINE DEL GIORNO

Seduta straordinaria in Teleconferenza del 29.10.2024

1. Approvazione schede istruttorie ed individuazione Centri prescrittori:

MALATTIE RARE

1.1. CEVENFACTA – eptacog beta è indicato adulti e adolescenti (a partire da dodici anni di età) per il trattamento di episodi emorragici e nella prevenzione di sanguinamenti durante gli interventi chirurgico procedure invasive nei seguenti gruppi di pazienti:

- Pazienti con emofilia congenita con inibitori ad alta risposta ai fattori di coagulazione VIII o IX (ad es. = 5 unità Bethesda[UB]);
- Pazienti con emofilia congenita con inibitori a basso titolo (UB < 5), ma nei quali è attesa un'alta risposta anamnestica alla somministrazione del fattore VIII o del fattore IX o refrattarietà all'incremento del dosaggio di FVIII o FIX

Istruttoria: UOC Governo Clinico - Azienda Zero

1.2. HEMLIBRA – emicizumab indicato per la profilassi di routine degli episodi emorragici in pazienti affetti da emofilia A (deficit congenito di fattore VIII): senza inibitori del fattore VIII che presentano malattia moderata (FVIII \geq 1% e \leq 5%) con fenotipo emorragico severo

Istruttoria: UOC Governo Clinico - Azienda Zero

AREA GASTROENTEROLOGICA

1.3. OMVOH – mirikizumab indicato per il trattamento di pazienti adulti con colite ulcerosa attiva di grado da moderato a grave che hanno avuto una risposta inadeguata, hanno perso la risposta o sono risultati intolleranti alla terapia convenzionale o a un trattamento biologico

Istruttoria: UOC Governo Clinico – Azienda Zero

2. Individuazione dei Centri prescrittori:

ONCOLOGIA

2.1. PHESGO – pertuzumab/trastuzumab indicato per l'uso in associazione con chemioterapia nel trattamento neoadiuvante di pazienti adulti con carcinoma mammario HER2 positivo, localmente avanzato, infiammatorio o allo stadio iniziale ad alto rischio di recidiva

Istruttoria: Segreteria CTRF



2.2. OPDUALAG – nivolumab/relatlimab indicato per il trattamento di prima linea del melanoma avanzato (non resecabile o metastatico) negli adulti e negli adolescenti di età pari o superiore a 12 anni con espressione tumorale del PD-L1 < 1%

Istruttoria: Segreteria CTRF

AREA DERMATOLOGICA

2.3. LITFULO – ritlecitinib per il trattamento dell'alopecia areata severa negli adulti e negli adolescenti di età pari o superiore a dodici anni

Istruttoria: Segreteria CTRF

2.4. ADTRALZA – tralokinumab indicato per il trattamento della dermatite atopica da moderata a severa in pazienti adolescenti (12-17 anni) che sono candidati alla terapia sistemica

Istruttoria: Segreteria CTRF

ALTRO

2.5. AQUIPTA – atogepant indicato per la profilassi dell'emicrania negli adulti che hanno almeno quattro giorni di emicrania al mese

Istruttoria: Segreteria CTRF

3. Aggiornamento sul farmaco UPSTAZA - eladocagene exuparvovec indicato per il trattamento di pazienti di età pari o superiore a diciotto mesi con una diagnosi di deficit di decarbossilasi degli L-aminoacidi aromatici (AADC) confermata dal punto di vista clinico, molecolare e genetico e con fenotipo severo

Aggiornamento a cura della Segreteria della CTRF

4. Varie ed eventuali