



Argomento all'ordine del giorno	Esito della seduta della CTRF
<p>1.1. TALTZ - Ixekizumab da solo o in associazione a metotrexato è indicato per il trattamento dell'artrite psoriasica attiva in pazienti adulti che hanno avuto una risposta inadeguata o che sono intolleranti a uno o più farmaci antireumatici modificanti la malattia (DMARD)</p> <p>1.2. GLYXAMBI - Empagliflozin e Linagliptin indicato negli adulti di età pari o superiore a 18 anni affetti da diabete mellito di tipo 2:</p> <ul style="list-style-type: none">- per migliorare il controllo della glicemia quando metformina e/o sulfanilurea (SU) e uno dei monocomponenti di Glyxambi non forniscono un adeguato controllo della glicemia;- in caso di terapia già in corso con empagliflozin e linagliptin in associazione libera. <p>1.3. QTERN - Saxagliptin e Dapagliflozin indicato in pazienti adulti a partire dai 18 anni di età con diabete mellito di tipo 2:</p> <ul style="list-style-type: none">- per migliorare il controllo glicemico quando metformina e/o sulfonilurea (SU) e uno dei principi attivi di Qtern non forniscono un adeguato controllo glicemico;- già in trattamento con la combinazione libera di dapagliflozin e saxagliptin. <p>1.4 BYDUREON – Exenatide indicato in pazienti adulti a partire dai 18 anni di età con diabete mellito di tipo 2 per migliorare il controllo glicemico:</p> <ul style="list-style-type: none">- in associazione con altri medicinali ipoglicemizzanti inclusa insulina basale, quando la terapia in uso, insieme alla dieta e all'esercizio fisico, non fornisce un adeguato controllo glicemico. <p>1.5 CHAMPIX - Vareniclina indicato per il trattamento della cessazione dell'abitudine al fumo nei pazienti affetti da BPCO e in prevenzione secondaria di patologie cardiovascolari.</p> <p>1.6 ADCETRIS – Brentuximab vedotin indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da Linfoma cutaneo a cellule T (CTCL) CD30 positivo, sottoposti ad almeno una precedente terapia sistemica.</p> <p>1.7 VEMLIDY - Tenofovir alafenamide il trattamento con Vemlidy a carico del SSN è limitato all'utilizzo nei soggetti con epatite cronica B in trattamento con tenofovir disoproxil e precedente esposizione ad analoghi nucleosidici che presentino età avanzata (>60 anni) e/o alterazione dei parametri di funzione renale e/o osseo come dettagliato nel piano terapeutico</p>	<p>1.1 la CTRF conclude la valutazione;</p> <p>1.2 la CTRF conclude la valutazione;</p> <p>1.3 la CTRF conclude la valutazione;</p> <p>1.4 la CTRF conclude la valutazione;</p> <p>1.5 la CTRF prende atto e prosegue la discussione;</p> <p>1.6 la CTRF conclude la valutazione;</p> <p>1.7 la CTRF conclude la valutazione;</p> <p>1.8 la CTRF conclude la valutazione.</p>



<p>1.8 LUCENTIS – Ranibizumab indicato negli adulti per il trattamento della diminuzione visiva dovuta a neovascolarizzazione coroideale (CNV).</p>	
<p>2. Raccomandazioni REV:</p> <ul style="list-style-type: none">- Mieloma multiplo precedentemente trattato con almeno una terapia: CARFILZOMIB (KYPROLIS®) DARATUMUMAB (DARZALEX®) ELOTUZUMAB (EMPLICITI®) IXAZOMIB (NINLARO®)- Monoterapia di mantenimento di pazienti adulti con mieloma multiplo di nuova diagnosi sottoposti a trapianto autologo di cellule staminali: LENALIDOMIDE (REVLIMID®)	<p>2. la CTRF conclude la valutazione.</p>
<p>3. Nota AIFA 96 relativa alla prescrizione, a carico del SSN, dei farmaci indicati per la prevenzione ed il trattamento della carenza di vitamina D nell'adulto (>18 anni).</p>	<p>3. la CTRF prende atto e prosegue la discussione.</p>
<p>4. Terapia con DAA per il trattamento dell'epatite C cronica a favore di pazienti con STP e ENI: allargamento Centri autorizzati alla prescrizione</p>	<p>4. la CTRF conclude la discussione.</p>
<p>5. Varie ed eventuali</p> <p>YESCARTA - Axicabtagene Ciloleucel indicato per il trattamento di pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B (diffuse large B- cell lymphoma, DLBCL) e linfoma primitivo del mediastino a grandi cellule B (primary mediastinal large B - cell lymphoma, PMBCL) refrattari o recidivanti, dopo due o più linee di terapia sistemica».</p>	<p>5. la CTRF conclude la valutazione.</p>