



Argomento all'ordine del giorno	Esito della seduta della CTRF
<p>1. Individuazione Centri prescrittori</p> <p>1.1. AVASTIN - Bevacizumab, in combinazione con carboplatino e paclitaxel è indicato per il trattamento di pazienti adulte con prima recidiva di carcinoma ovarico epiteliale, carcinoma alle tube di Falloppio o carcinoma peritoneale primario platino-sensibili che non hanno ricevuto una precedente terapia con bevacizumab o altri inibitori del fattore di crescita dell'endotelio vascolare (vascular endothelial growth factor, VEGF) o altri agenti mirati al recettore VEGF</p> <p>1.2 TOOKAD – Padeliporfina indicata in monoterapia per pazienti adulti affetti da adenocarcinoma della prostata unilaterale, a basso rischio e non trattato precedentemente, con un'aspettativa di vita ≥ 10 anni e: stadio clinico T1c o T2a; punteggio Gleason ≤ 6, sulla base di tecniche biottiche ad alta risoluzione; PSA ≤ 10 ng/mL; 3 prelievi biottici positivi per tumore con una lunghezza massimo del tumore pari a 5 mm in uno qualsiasi dei prelievi o 1-2 prelievi positivi per tumore con interessamento tumorale $\geq 50\%$ in uno qualsiasi dei prelievi o una densità del PSA (PSA density) $\geq 0,15$ ng/mL/cm³.</p> <p>1.3 BLINCYTO – Blinatumomab: - indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti pediatriche di età pari o superiore ad un anno con LLA da precursori delle cellule B, recidivante o refrattaria, positiva per CD19, negativa per il cromosoma Philadelphia, in recidiva dopo aver ricevuto almeno due precedenti terapie o in recidiva dopo allotrapianto di cellule staminali ematopoietiche</p> <p>1.4 BLINCYTO – Blinatumomab: - indicato in monoterapia per il trattamento di adulti con LLA da precursori delle cellule B negativa per il cromosoma Philadelphia, positiva per il CD19, in prima o seconda remissione completa con malattia minima residua (MRD), superiore o uguale allo 0,1%</p> <p>1.5 ZAVESCA – Miglustat - dal 2005: indicato per il trattamento orale della malattia di Gaucher di tipo 1 di pazienti adulti con sintomatologia da lieve a moderata. - dal 2010: indicato per il trattamento delle manifestazioni neurologiche progressive in pazienti adulti ed in pazienti in età pediatrica affetti dalla malattia di Niemann-Pick di tipo C.</p> <p>1.6 GILENYA – Fingolimod indicato in monoterapia, come farmaco modificante la malattia, nella sclerosi</p>	<p>1.1 la CTRF conclude la valutazione;</p> <p>1.2 la CTRF prende atto e prosegue la valutazione;</p> <p>1.3 la CTRF conclude la valutazione;</p> <p>1.4 la CTRF conclude la valutazione;</p> <p>1.5 la CTRF conclude la valutazione;</p> <p>1.6 la CTRF conclude la valutazione.</p>



<p>multipla recidivante- remittente ad elevata attività nei seguenti gruppi di pazienti adulti e di pazienti pediatrici di 10 anni di età e oltre: pazienti con malattia ad elevata attività nonostante un ciclo terapeutico completo ed adeguato con almeno una terapia disease modifying ; oppure pazienti con sclerosi multipla recidivante-remittente severa ad evoluzione rapida, definita da due o più recidive disabilitanti in un anno, e con 1 o più lesioni captanti gadolinio alla RM cerebrale o con un aumento significativo del carico lesionale in T2 rispetto ad una precedente RM effettuata di recente</p>	
<p>2. Integrazione Centri Prescrittori DDR 142/2014 – belimumab; DGR 1451/2018 – teriparatide; DDR 224/2014 - DAA</p>	2. la CTRF conclude la valutazione
<p>3. Inserimento testosterone e farmaci estrogeni nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per l'impiego nel processo di virilizzazione/femminilizzazione di transgender, previa diagnosi di disforia di genere/incongruenza di genere formulata da una equipe multidisciplinare e specialistica dedicata.</p>	3. la CTRF prende atto e prosegue la discussione
<p>4. Varie ed eventuali 4.1 Fornitura e distribuzione Remdesivir 4.2 Presentazione dati Fondo 5% anno 2019 4.3 Presentazione ricognizione procedure allestimento bevacizumab intravitreale</p>	4.1 la CTRF conclude la discussione; 4.2 la CTRF conclude la discussione; 4.3 argomento rinviato