

# Tabella riassuntiva

## Sistema di sorveglianza PASSI 2009

### Descrizione del campione

	Veneto	Pool di ASL italiane
Numerosità	5.399	39.231
Uomini	50,2%	49,3
Donne	49,8%	50,7
Età media	45 anni	44 anni
18-34	26,0%	28,1
35-49	36,3%	34,7
50-69	37,7%	37,2
Titolo di studio		
nessuno/elementare	12,4%	11,9
media inferiore	32,1%	30,4
media superiore	43,6%	43,9
laurea	11,9%	13,8
Livello di istruzione		
alto <sup>1</sup>	55,5%	57,7
basso <sup>2</sup>	44,5%	42,3
Stato civile		
coniugati	61,5%	60,8
celibi/nubili	31,2%	31,9
vedovi/e	2,2%	4,7
separati/divorziati	5,1%	2,6
Cittadinanza straniera	5,8%	3,1
Lavoro regolare <sup>3</sup>	68,7%	58,4
Difficoltà economiche		
nessuna	55,7%	13,4
qualche	36,6%	40,7
molte	7,7%	45,9

### Percezione dello stato di salute (% - IC 95%)

	Veneto	Pool di ASL italiane
Risponde bene/molto bene alla domanda sul proprio stato di salute	68,9 (67,6-70,1)	67,5 (66,9-68,0)
Numero di giorni riferiti in cattiva salute per motivi fisici, psicologici e con limitazione di attività		
0 giorni	84,4 (83,4-85,4)	83,0 (82,5-83,5)
1-13 giorni	12,4 (11,4-13,3)	13,7 (13,2-14,1)
14+ giorni	3,2 (2,7-3,7)	3,3 (3,1-3,6)

### Vaccinazione antinfluenzale (% - IC 95%)

	Veneto	Pool di ASL italiane
Vaccinati 18-64 (campagna antinfluenzale 2007-08)	13,3 (11,8-14,8)	12,8 (12,2-13,4)
Vaccinati 18-64 con almeno 1 patologia	25,4 (20,5-30,3)	31,8 (29,6-34,1)

<sup>1</sup>licenza media superiore o laurea

<sup>2</sup>licenza media inferiore o licenza elementare o nessun titolo

<sup>3</sup>campione compreso tra 18 e 65 anni

## Attività fisica (% - IC 95%)

	Veneto	Pool di ASL italiane
Livello di attività fisica		
attivo <sup>4</sup>	29,5 (28,2-30,8)	33,0 (32,4-33,6)
parzialmente attivo <sup>5</sup>	45,0 (43,5-46,4)	36,8 (36,2-37,5)
sedentario <sup>6</sup>	25,5 (24,2-26,8)	30,2 (29,6-30,8)
Riferisce che un medico/operatore sanitario ha chiesto al proprio assistito se fanno regolare attività fisica <sup>7</sup>	36,5 (34,9-38,0)	30,7 (30,0-31,4)
Riferisce che un medico/operatore sanitario ha consigliato al proprio assistito di fare dell'attività fisica <sup>7</sup>	33,8 (32,3-35,3)	30,5 (29,8-31,1)
Sedentari che percepiscono sufficiente il proprio livello di attività fisica	15,8 (13,8-17,8)	18,9 (18,0-19,9)

## Abitudine al fumo (% - IC 95%)

	Veneto	Pool di ASL italiane
Abitudine al fumo		
Fumatori <sup>8</sup>	24,9 (23,6-26,1)	28,8 (28,2-29,4)
uomini	29,6 (27,7-31,5)	33,4 (32,6-34,3)
donne	20,1 (18,4-21,7)	24,3 (23,5-25,1)
Ex fumatori <sup>9</sup>	22,1 (20,9-23,2)	19,6 (19,1-20,1)
Non fumatori <sup>10</sup>	53,1 (51,7-54,5)	51,6 (51,0-52,2)
Fumatori		
18-24	33,6 (29,1-38,1)	32,3 (30,4-34,2)
25-34	31,6 (28,4-34,8)	35,1 (33,7-36,5)
35-49	24,6 (22,5-26,7)	30,0 (29,0-31,0)
50-69	19,0 (17,1-20,9)	23,2 (22,3-24,1)
Livello di istruzione		
Nessun titolo/elementare	18,4 (15,2-21,6)	23,6 (22,0-25,3)
Scuola media inferiore	29,0 (26,7-31,3)	34,1 (33,0-35,2)
Scuola media superiore	26,3 (24,4-28,3)	28,8 (27,9-29,7)
Laurea	15,4 (12,2-18,6)	21,7 (20,2-23,1)
Difficoltà economiche		
Molte	36,8 (31,7-41,9)	37,1 (35,3-39,0)
Qualche	27,4 (25,2-29,6)	30,3 (29,3-31,2)
Nessuna	21,7 (20,2-23,3)	25,2 (24,4-26,0)
Numero medio di sigarette	11	13
Chiesto se fuma <sup>7</sup>		
a tutto il campione	42,4 (40,9-43,9)	41,0 (40,3-41,6)
ai fumatori	69,7 (66,7-72,7)	64,0 (62,0-65,2)
Consigliato di smettere di fumare (ai fumatori) <sup>7</sup>	62,2 (59,0-65,3)	60,1 (58,8-61,4)
Fumatori che hanno tentato di smettere nell'ultimo anno	45,2 (42,3-48,1)	36,1 (35,0-37,3)
Ex fumatori che hanno smesso da soli	95,4 (94,2-96,6)	96,1 (95,4-96,7)
Rispetto divieto di fumo al lavoro (su chi lavora in ambienti chiusi):		
sempre o quasi sempre	92,9 (91,9-93,8)	88,3 (87,7-88,8)
Rispetto divieto di fumo nei luoghi pubblici:		
sempre o quasi sempre	94,3 (93,6-95,0)	86,6 (86,1-87,1)

<sup>4</sup>lavoro pesante oppure adesione alle linee guida (30 minuti di attività moderata per almeno 5 giorni alla settimana oppure attività intensa per più di 20 min per almeno 3 giorni)

<sup>5</sup>non fa lavoro pesante, ma fa qualche attività fisica nel tempo libero, senza però raggiungere i livelli raccomandati

<sup>6</sup>non fa un lavoro pesante e non fa nessuna attività fisica nel tempo libero

<sup>7</sup>vengono escluse le persone che non sono state dal medico negli ultimi 12 mesi

<sup>8</sup>più di 100 sigarette nella propria vita e attualmente fumano tutti i giorni o qualche giorno o hanno smesso da meno di sei mesi

<sup>9</sup>più di 100 sigarette nella propria vita e attualmente non fumano da almeno 6 mesi

<sup>10</sup>meno di 100 sigarette nella propria vita e attualmente non fumano o non hanno mai fumato

## Situazione nutrizionale e abitudini alimentari (% - IC 95%)

	Veneto	Pool di ASL italiane
Popolazione in eccesso ponderale		
sovrappeso	30,0 (28,7-31,3)	31,8 (31,2-32,4)
obeso	10,2 (9,3-11,0)	10,4 (10,0-10,8)
sovrappeso/obeso	40,1 (38,8-41,5)	42,2 (41,6-42,8)
Consigliato di perdere peso da un medico o operatore sanitario <sup>11</sup>		
sovrappeso	44,2 (41,4-47,0)	45,2 (43,9-46,4)
obeso	78,8 (74,9-82,7)	80,1 (78,2-81,9)
sovrappeso/obeso	53,4 (51,0-55,9)	54,1 (53,6-55,1)
Consigliato di fare attività fisica da un medico o operatore sanitario <sup>11</sup>		
sovrappeso	40,2 (37,3-43,1)	34,7 (33,5-35,9)
obesi	53,7 (48,9-58,5)	48,2 (45,9-50,5)
sovrappeso/obeso	43,9 (41,4-46,4)	38,1 (37,1-39,2)
Almeno 5 porzioni di frutta e verdura al giorno	12,6 (11,7-13,6)	9,5 (9,1-9,8)

## Consumo di alcol (% - IC 95%)

	Veneto	Pool di ASL italiane
Bevuto ≥1 unità di bevanda alcolica nell'ultimo mese <sup>12</sup>	63,9 (62,6-65,2)	56,7 (56,1-57,3)
Bevitori (prevalentemente) fuori pasto	11,5 (10,6-12,3)	7,8 (7,5-8,1)
Bevitori binge <sup>13</sup>	7,7 (6,9-8,4)	5,6 (5,3-5,9)
Forti bevitori <sup>14</sup>	11,8 (10,9-12,7)	9,3 (8,9-9,6) <sup>15</sup>
Bevitori a rischio <sup>16</sup>	23,6 (22,5-24,8)	18,0 (17,5-18,4) <sup>17</sup>
Chiesto dal medico il consumo di alcolici	18,3 (17,2-19,5)	14,3 (13,8-14,8)
Consigliato dal medico ai bevitori a rischio di ridurre il consumo	5,5 (4,1-6,9)	6,3 (5,6-7,2) <sup>18</sup>

## Sicurezza stradale (% - IC 95%)

	Veneto	Pool di ASL italiane
Persone che utilizzano i vari dispositivi di sicurezza <sup>19</sup>		
casco sempre	98,0 (97,2-98,9)	94,2 (93,5-94,9)
cintura anteriore sempre	91,4 (90,6-92,2)	82,4 (81,9-82,9)
cintura posteriore sempre	31,7 (30,2-33,2)	18,9 (18,4-19,4)
Guida sotto effetto dell'alcol <sup>20</sup>	12,1 (11,0-13,2)	10,5 (10,1-11,1)
Trasportato da un conducente sotto effetto dell'alcol	9,2 (8,4-10,0)	7,1 (6,8-7,4)

## Ipertensione arteriosa (% - IC 95%)

	Veneto	Pool di ASL italiane
Misurazione di P.A. negli ultimi 2 anni	85,5 (84,5-86,5)	83,0 (82,5-83,5)
Persone che riferiscono di essere ipertese <sup>21</sup>	21,3 (20,2-22,4)	20,3 (19,8-20,8)

<sup>11</sup>solo tra chi e' andato dal medico nell'ultimo anno; non so/non ricordo codificato come no

<sup>12</sup>una unità di bevanda alcolica equivale ad una lattina di birra o ad un bicchiere di vino o ad un bicchierino di liquore

<sup>13</sup>nell'ultimo mese consumo almeno una volta di 6 o più unità di bevande alcoliche in una sola occasione

<sup>14</sup>più di 2 unità/gg per gli uomini e più di 1/gg per le donne

<sup>15</sup>applicando la vecchia definizione di forte consumo: Pool di ASL italiane 3,0 (2,9-3,2); Veneto 4,0 (3,5-4,5)

<sup>16</sup>bevitori fuori pasto o binge o forti bevitori

<sup>17</sup>applicando la vecchia definizione di forte consumo: Pool di ASL italiane 13,6 (13,2-14,0); Veneto 18,5 (17,5-19,5)

<sup>18</sup>applicando la vecchia definizione di forte consumo: Pool di ASL italiane 6,8 (6,0-7,8); Veneto 6,1 (4,5-7,7)

<sup>19</sup>calcolata su tutta la popolazione, escluso chi non viaggia in moto o in automobile

<sup>20</sup>aver guidato entro un' ora dall'aver bevuto ≥2 unità di bevanda alcolica nell'ultimo mese, calcolata sulla popolazione che dichiara di aver bevuto e guidato negli ultimi 30 gg.

<sup>21</sup>tra le persone cui è stata misurata la pressione arteriosa

## Colesterolemia (% - IC 95%)

	Veneto	Pool di ASL italiane
Misurazione del colesterolo almeno una volta nella vita	78,9 (77,8-80,0)	79,3 (78,8-79,8)
Persone che riferiscono di essere ipercolesterolemiche <sup>22</sup>	26,0 (24,6-27,3)	24,1 (23,5-24,7)

## Punteggio di rischio cardiovascolare ( $\geq 35$ ) (% - IC 95%)

	Veneto	Pool di ASL italiane
Calcolo riferito del punteggio cardiovascolare <sup>23</sup>	7,0 (6,1-7,9)	6,8 (6,5-7,2)

## Diagnosi precoce delle neoplasie del collo dell'utero (donne 25 - 64 anni) (% - IC 95%)

	Veneto	Pool di ASL italiane
Effettuato un pap test preventivo negli ultimi 3 anni	83,5 (81,8-85,2)	72,9 (72,0-73,8)
Donne che hanno aderito allo screening organizzato	42,4 (40,2-44,5)	36,0 (35,1-36,9)
Donne che hanno effettuato il test spontaneamente	41,0 (38,8-43,1)	36,5 (35,5-37,4)
Donne che hanno ricevuto la lettera dell'ASL	73,7 (71,7-75,7)	53,3 (52,5-54,1)
Donne che hanno ricevuto il consiglio dell'operatore sanitario	65,8 (63,7-68,0)	61,4 (60,4-62,4)
Donne che hanno visto una campagna informativa	64,4 (62,3-66,4)	64,8 (63,8-65,7)
Influenza positiva (molta/abbastanza) di		
lettera dell'ASL	67,0	70,4
consiglio dell'operatore	81,6	83,2
campagna comunicativa	72,1	70,1
Donne che hanno effettuato un pap test preventivo negli ultimi 3 anni in funzione degli interventi di sensibilizzazione (consiglio medico, lettera dell'ASL, campagna comunicativa)		
0 interventi	54,2 (43,8-64,5)	40,1 (36,3-43,9)
1 intervento	78,4 (74,0-82,8)	65,8 (63,6-67,9)
2 interventi	87,8 (85,3-90,4)	81,1 (79,7-82,5)
tutti e 3 gli interventi	92,6 (90,6-94,5)	87,3 (86,1-88,6)

## Diagnosi precoce delle neoplasie della mammella (donne 50 - 69 anni) (% - IC 95%)

	Veneto	Pool di ASL italiane
Effettuato una mammografia preventiva negli ultimi 2 anni	81,5 (78,7-84,2)	68,3 (67,0-69,7)
Donne che hanno aderito allo screening organizzato	60,4 (57,0-63,8)	50,0 (48,6-51,4)
Donne che hanno effettuato il test spontaneamente	20,6 (17,8-23,5)	17,9 (16,7-19,0)
Donne che hanno ricevuto la lettera dell'ASL	82,7 (80,0-85,3)	62,6 (61,5-63,7)
Donne che hanno ricevuto il consiglio dell'operatore sanitario	66,6 (63,5-69,7)	63,7 (62,3-65,2)
Donne che hanno visto una campagna informativa	70,5 (67,6-73,3)	70,1 (68,8-71,4)
Influenza positiva (molta/abbastanza) di		
lettera dell'ASL	77,3	79,7
consiglio dell'operatore	87,1	87,5
campagna comunicativa	78,0	74,8
Donne che hanno effettuato una mammografia preventiva negli ultimi 2 anni in funzione degli interventi di sensibilizzazione (consiglio medico, lettera dell'ASL, campagna comunicativa)		
0 interventi	49,3 (28,1-70,5)	27,2 (21,9-32,4)
1 intervento	74,0 (66,5-81,5)	52,6 (49,1-56,1)
2 interventi	80,0 (75,0-85,0)	73,6 (71,2-76,0)
tutti e 3 gli interventi	88,9 (85,7-92,0)	83,0 (81,3-84,8)

<sup>22</sup>tra le persone cui è stata misurata la colesterolemia

<sup>23</sup>su tutte le persone >34 anni, senza patologie CV

## Diagnosi precoce delle neoplasie del colon-retto (50 – 69 anni) (% - IC 95%)

	Veneto	Pool di ASL italiane
Eseguito un test per la ricerca di sangue occulto a scopo preventivo, nei tempi raccomandati (entro 2 anni)	42,5 (40,4-44,5)	23,0 (22,3-23,6)
Eseguito un test per la colonscopia a scopo preventivo, nei tempi raccomandati (entro 5 anni)	12,4 (10,7-14,0)	9,5 (8,8-10,1)
Ha ricevuto la lettera dell' AULSS	52,4 (50,6-54,2)	28,7 (28,2-29,3)
Ha ricevuto il consiglio dell'operatore sanitario	31,8 (29,7-33,9)	26,3 (25,4-27,3)
Ha visto una campagna informativa	51,8 (49,6-54,0)	40,7 (39,7-41,7)
Personale che hanno eseguito test per la ricerca di sangue occulto o colonscopia a scopo preventivo nei tempi raccomandati, in funzione degli interventi di sensibilizzazione (consiglio medico, lettera dell'ASL, campagna comunicativa)		
0 interventi	13,1 (9,5-16,7)	5,2 (4,5-5,9)
1 intervento	44,7 (40,3-49,1)	32,0 (30,1-33,9)
2 interventi	79,0 (75,5-82,5)	68,4 (66,3-70,5)
tutti e 3 gli interventi	85,9 (82,0-89,8)	77,3 (74,7-79,8)

## Vaccinazione antirosolia (% - IC 95%)

	Veneto	Pool di ASL italiane
Donne vaccinate (18-49 anni)	60,5 (58,0-63,0)	33,3 (32,3-34,3)
Donne (18-49 anni) suscettibili <sup>24</sup>	31,2 (28,8-33,5)	43,1 (42,0-44,2)

## Sintomi di depressione (% - IC 95%)

	Veneto	Pool di ASL italiane
Sintomi di depressione nelle ultime 2 settimane <sup>25</sup>	6,9 (6,2-7,6)	6,8 (6,5-7,1)
donne	9,3 (8,1-10,5)	9,0 (8,5-9,6)
uomini	4,5 (3,7-5,4)	4,5 (4,1-5,0)
18-34	7,4 (6,0-8,8)	5,1 (4,7-5,7)
35-49	6,4 (5,2-7,6)	6,5 (6,0-7,1)
50-69	7,0 (5,8-8,2)	8,5 (7,8-9,2)
almeno 1 patologia	11,5 (9,3-13,8)	13,4 (12,3-14,6)
Ha cercato aiuto da qualcuno <sup>26</sup>	55,6 (50,5-60,8)	56,1 (53,9-58,3)
Figure a cui si è ricorso per sintomi di depressione		
nessuno	44,3 (39,2-49,5)	43,9 (41,7-46,1)
medico/operatore sanitario	29,3 (24,5-34,0)	31,3 (29,0-33,7)
famiglia/amici	21,2 (17,3-25,1)	18,2 (16,1-20,5)
entrambi	5,2 (2,8-7,7)	6,6 (5,4-8,2)

<sup>24</sup>donna suscettibile = non è stata vaccinata o non ha mai effettuato il rubeotest

<sup>25</sup>score calcolato sulla base del numero di giorni, nelle ultime 2 settimane, con poco interesse o piacere nel fare le cose o giù di morale, depresso/a o senza speranza

<sup>26</sup>calcolata sulle persone depresse (N.B. la domanda non è stata fatta a tutte le persone che vengono classificate come depresse utilizzando lo score)

## Sicurezza domestica (% - IC 95%)

	Veneto	Pool di ASL italiane
Bassa percezione del rischio di infortunio domestico	94,9 (94,3-95,5)	92,6 (92,3-93,0)
Dichiarano di aver modificato comportamenti o adottato misure preventive <sup>27</sup>	29,2 (26,3-32,0)	30,8 (29,4-32,2)
Dichiara di aver ricevuto informazioni sulla prevenzione degli infortuni	25,7 (24,5-26,9)	24,0 (23,5-24,5)
Fonti di informazione:		
opuscoli	14,1 (13,1-15,1)	11,5 (11,1-11,9)
mass media	11,8 (10,9-12,7)	12,5 (12,1-12,9)
tecnici	2,6 (2,2-3,1)	3,0 (2,7-3,1)
medico/altro operatore sanitario	1,7 (1,4-2,1)	1,8 (1,6-1,9)
parenti/amici	0,5 (0,3-0,7)	0,7 (0,6-0,8)

Le percentuali e gli IC95% sono stati approssimati alla prima cifra decimale.

### Sistema di pesature per dato di pool di ASL 2009

I pesi sono calcolati per ricostruire un'Italia e un Veneto teorici, integrando i dati delle zone con un numero consistente di interviste con quelli delle zone, in cui sono disponibili poche interviste, ma comunque interessanti e di cui occorre tener conto. Il peso viene calcolato in base alla rappresentatività della singola ASL sul totale della popolazione italiana (sempre strato specifico), escludendo le ASL che non partecipano o non entrano nel gruppo utilizzato.

<sup>27</sup>calcolata solo su coloro che hanno dichiarato di aver ricevuto informazioni