

NET/NI IN VALUTAZIONE A GENNAIO 2026

BELZUTIFAN - Tumori associati alla malattia di von Hippel-Lindau (VHL): In monoterapia nel trattamento di pazienti adulti con malattia di von Hippel-Lindau che necessitano di terapia per carcinoma a cellule renali (RCC) localizzato, per emangioblastomi del sistema nervoso centrale (SNC) o per tumori neuroendocrini del pancreas (*pancreatic neuroendocrine tumours*, pNET) associati alla malattia di von Hippel-Lindau e per i quali le procedure locali non sono adeguate.

DOSTARLIMAB - Cancro endometriale: in combinazione con carboplatino e paclitaxel per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con carcinoma endometriale (EC) avanzato primario o recidivante, che siano candidati a una terapia sistemica.

DURVALUMAB - Carcinoma della vescica muscolo invasivo (MIBC): IMFINZI in associazione a gemcitabina e cisplatino come trattamento neoadiuvante, seguito da IMFINZI in monoterapia come trattamento adiuvante dopo la cistectomia radicale, è indicato per il trattamento di adulti con carcinoma della vescica muscolo invasivo (MIBC) resecabile.

NIVOLUMAB (FORMULAZIONE SC) - rene, urotelio, GI e melanoma.

NET/NI IN VALUTAZIONE A FEBBRAIO 2026

DURVALUMAB - LS-SCLC: indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma polmonare a piccole cellule in stadio limitato (LS-SCLC) la cui malattia non è progredita a seguito di chemioradioterapia a base di platino.

DURVALUMAB - NSCLC: in associazione a chemioterapia a base di platino come trattamento neoadiuvante, seguito da IMFINZI in monoterapia come trattamento adiuvante, è indicato per il trattamento di pazienti adulti con NSCLC resecabile ad alto rischio di recidiva e in assenza di mutazioni di EGFR (recettore del fattore di crescita dell'epidermide) o riarrangiamenti di ALK (chinasi del linfoma anaplastico).

ATEZOLIZUMAB - Cancro del polmone non a piccole cellule (NSCLC): per includere nell'ambito del carcinoma polmonare non a piccole cellule (*non small cell lung cancer*, NSCLC) in fase avanzata anche il trattamento in monoterapia di prima linea per i pazienti adulti che non sono idonei a ricevere una terapia a base di platino.

DAROLUTAMIDE – mHSPC: cancro della prostata metastatico ormono-sensibile (mHSPC) in associazione con terapia di depravazione androgenica.