

MARZO 2026

NET	NI	Indicazione terapeutica oggetto di valutazione
	Nivolumab	OPDIVO in monoterapia è indicato per il trattamento adiuvante di pazienti adulti con carcinoma uroteliale muscolo invasivo (MIUC) con espressione tumorale del PD-L1 $\geq$ 1%, che sono ad alto rischio di recidiva dopo resezione radicale del MIUC.
	Atezolizumab	Cancro del polmone non a piccole cellule (NSCLC) - Per includere nell'ambito del carcinoma polmonare non a piccole cellule (non small cell lung cancer, NSCLC) in fase avanzata anche il trattamento in monoterapia di prima linea per i pazienti adulti che non sono idonei a ricevere una terapia a base di platino.
zanidatamab		Cancro delle vie biliari (BTC) - Ziihera è indicato in monoterapia per il trattamento di adulti con cancro delle vie biliari (BTC) HER2-positivo (IHC 3+) non resecabile localmente avanzato o metastatico, precedentemente trattato con almeno una linea di terapia sistemica.
inavolisib		Carcinoma della mammella - Itovebi, in associazione a palbociclib e fulvestrant, è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da cancro della mammella con mutazione di PIK3CA, positivo al recettore degli estrogeni (ER), HER2-negativo, localmente avanzato o metastatico, in seguito a recidiva durante o entro 12 mesi dal completamento del trattamento endocrino adiuvante. I pazienti precedentemente trattati con un inibitore di CDK 4/6 nel setting (neoadiuvante) devono aver avuto un intervallo di almeno 12 mesi tra la cessazione del trattamento con inibitore di CDK 4/6 e il rilevamento della recidiva. Nelle donne in pre/perimenopausa e negli uomini, la terapia endocrina deve essere combinata con un agonista dell'ormone di rilascio dell'ormone luteinizzante (LHRH).

APRILE 2026

	Cabozantinib	Tumori neuroendocrini ben differenziati extra-pancreatici (epNET) e pancreatici (pNET) - CABOMETYX è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da tumori neuroendocrini ben differenziati extra-pancreatici (epNET) e pancreatici (pNET), non resecabili o metastatici, che sono progrediti dopo almeno una precedente terapia sistemica diversa dagli analoghi della somatostatina.
Nirogacestat		Tumori Desmoidi - Ogsiveo in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con tumori desmoidi in progressione che richiedono un trattamento sistemico