



COMMISSIONE TECNICA REGIONALE FARMACI
ORDINE DEL GIORNO

Seduta straordinaria in Teleconferenza del 4.5.2026

1. Aggiornamento della composizione della CTRF

Comunicazione della Segreteria della CTRF

2. Rapporto di Farmacovigilanza dell'anno 2025: presentazione

Presentazione: Centro Regionale di Farmacovigilanza

3. Argomenti sospesi nelle sedute della CTRF precedenti

3.1 Valutazione delle richieste di riconoscimento di ulteriori Centri autorizzati alla prescrizione dei seguenti farmaci:

- **Ranibizumab (Lucentis®) - Alfibercept (Eylea®)** per il trattamento della retinopatia del prematuro (ROP);

Istruttoria: Segreteria della CTRF

3.2 DUPIXENT – dupilumab indicato per il trattamento dell'esofagite eosinofila in bambini di età compresa tra 1 e 11 anni e un peso di almeno 15kg, non adeguatamente controllati da, intolleranti a, o che non sono candidati per la terapia farmacologica convenzionale

Istruttoria: Segreteria della CTRF

3.3 Procedura per la valutazione regionale dei farmaci C(nn): proposta di aggiornamento

Istruttoria: Direzione Farmaceutico-Protesica Dispositivi Medici

4. Approvazione schede istruttorie ed individuazione Centri prescrittori

AREA ONCOLOGICA

4.1 TEVIMBRA – tislelizumab indicato in monoterapia indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o metastatico, dopo una precedente chemioterapia a base di platino. I pazienti affetti da NSCLC EGFR mutato o ALK positivo devono aver ricevuto anche terapie mirate prima di assumere tislelizumab

Istruttoria: Coordinamento Regionale Attività Oncologiche (CRAO)



4.2 TEVIMBRA – tislelizumab indicato in combinazione con chemioterapia a base di platino, è indicato per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con OSCC non resecabile, localmente avanzato o metastatico i cui tumori esprimono PD-L1 con un punteggio TAP $\geq 5\%$.

Istruttoria: Coordinamento Regionale Attività Oncologiche (CRAO)

4.3 TEVIMBRA – tislelizumab indicato in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con OSCC non resecabile, localmente avanzato o metastatico, dopo una precedente chemioterapia a base di platino.

Istruttoria: Coordinamento Regionale Attività Oncologiche (CRAO)

4.4 TEVIMBRA – tislelizumab indicato in combinazione con chemioterapia a base di platino e fluoropirimidina, è indicato per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con adenocarcinoma gastrico o della giunzione gastroesofagea (G/GEJ) non resecabile, localmente avanzato o metastatico HER-2 negativo, i cui tumori esprimono PD-L1 con un punteggio di Positività dell'Area Tumorale (TAP) $\geq 5\%$.

Istruttoria: Coordinamento Regionale Attività Oncologiche (CRAO)

MALATTIE RARE

4.5 FABHALTA – iptacopan indicato per il trattamento dei pazienti adulti con glomerulopatia da C3 (C3G) in associazione con un inibitore del sistema renina angiotensina (RAS), oppure in pazienti che sono intolleranti agli inibitori di RAS o per i quali un inibitore di RAS è controindicato

Istruttoria: UOC Governo Clinico – Azienda Zero

4.6 YORVIPATH – palopegteriparatide, terapia sostitutiva dell'ormone paratiroideo (PTH), indicata per il trattamento di adulti con ipoparatiroidismo cronico che non sono adeguatamente controllati con la terapia convenzionale (vitamina D e Calcio) e non adeguatamente controllati con teriparatide o con controindicazioni alla stessa.

Istruttoria: UOC Governo Clinico – Azienda Zero

ALTRO

4.7 CEVEDALO – donepezil/memantina indicato come terapia sostitutiva per il trattamento sintomatico della malattia di Alzheimer da moderata a severa in pazienti adulti già adeguatamente controllati con donepezil e memantina somministrati contemporaneamente alle stesse dosi dell'associazione

Istruttoria: UOC Governo Clinico – Azienda Zero

4.8 RECIGAR – citisina indicato nella cessazione dell'abitudine al fumo nei pazienti adulti



Istruttoria: UOC Governo Clinico – Azienda Zero

4.9 LYVDELZI – seladelpar indicato per il trattamento della colangite biliare primaria (primary biliary cholangitis, PBC) in combinazione con acido ursodesossilico (UDCA) negli adulti che hanno una risposta inadeguata al solo UDCA o in monoterapia in quelli ove UDCA non è tollerato

Istruttoria: UOC Governo Clinico – Azienda Zero

5. Farmaci per il trattamento della Fibrosi Cistica: valutazione della scheda informativa dei farmaci ALYFTREK - deutivacaftor, tezacaftor e vanzacaftor, KAFTRIO - ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor e KALYDECO - ivacaftor

Istruttoria: UOC Governo Clinico – Azienda Zero

6. Varie ed eventuali