



COMMISSIONE TECNICA REGIONALE FARMACI

ORDINE DEL GIORNO

Seduta straordinaria in Teleconferenza del 08.07.2026

1. **Approvazione del verbale** della seduta del 27 maggio

2. **Aggiornamento NOTE AIFA n. 39, n. 74, n. 97 e n. 99**

Comunicazioni e istruttoria: DFPDM

3. **Farmaco C(nn) TEPEZZA – teprotumumab** indicato negli adulti per il trattamento della malattia oculare tiroidea (TED) da moderata a severa

Istruttoria: Segreteria CTRF

4. **Yorvipath – palopegteriparatide**: rivalutazione dell'elenco dei centri prescrittori

Istruttoria: Segreteria CTRF

5. **Documento di indirizzo regionale per l'impiego e il monitoraggio dei farmaci per il trattamento della psoriasi di grado moderato-severo**

Istruttoria: Coordinatore del GdL regionale farmaci biologici area dermatologica

6. **Valutazione della richiesta di riconoscimento di ulteriore Centro di II livello – Rete dei centri Prescrittori dei farmaci di area oncoematologica.**

Istruttoria: Segreteria CTRF

7. **Argomenti rimandati e sospesi dalle precedenti sedute della CTRF:**

7.1 **Individuazione dei Centri prescrittori del farmaco RECIGAR – citisina** indicato per cessazione dell'abitudine al fumo nei pazienti adulti: **proposta di aggiornamento**

Istruttoria: Segreteria CTRF

7.2. **Farmaci per il trattamento della Fibrosi Cistica**: valutazione della scheda informativa dei farmaci ALYFTREK - deutivacaftor, tezacaftor e vanzacaftor, KAFTRIO - ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor e KALYDECO - ivacaftor

Istruttoria: UOC Governo Clinico – Azienda Zero



MALATTIE RARE

7.3. FASENRA – benralizumab indicato nel trattamento aggiuntivo per pazienti adulti con granulomatosi eosinofila con poliangite (EGPA) recidivante o refrattaria - **sospeso**

Istruttoria: UOC Governo Clinico – Azienda Zero

7.4. AGAMREE – vamorolone indicato per il trattamento della distrofia muscolare di Duchenne (DMD) in pazienti di età pari o superiore a 4 anni

Istruttoria: UOC Governo Clinico – Azienda Zero

AREA EMATOLOGICA

7.5. ABECMA – idecabtagene vicleucel indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo recidivante e refrattario che hanno ricevuto almeno due precedenti terapie, inclusi un agente immunomodulatore, un inibitore del proteasoma e un anticorpo anti-CD38, e che hanno dimostrato progressione della malattia durante l'ultima terapia - **sospeso**

Istruttoria: UOC Governo Clinico – Azienda Zero

ALTRO

7.6. SIVEXTRO – tedezolid indicato per il trattamento di infezioni batteriche acute della pelle e della struttura cutanea (ABSSSI) nei bambini di peso corporeo ≥ 35 kg per le compresse e fin dalla nascita per la soluzione per infusione

Istruttoria: UOC Governo Clinico – Azienda Zero

AREA ONCOLOGICA

7.7. NUBEQA – darolutamide indicato per il trattamento degli uomini adulti con cancro della prostata metastatico ormono-sensibile (mHSPC) in associazione con terapia di deprivazione androgenica

Istruttoria: Coordinamento Regionale Attività Oncologiche (CRAO)

8. Approvazione schede istruttorie ed individuazione Centri prescrittori:

AREA ONCOLOGICA

8.1. ELAHERE – mirvetuximab soravtansin in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulte con cancro epiteliale dell'ovaio, cancro della tuba di Falloppio o cancro peritoneale primitivo, positivo al recettore alfa dei folati (FR α), platino resistente, sieroso di alto grado, che hanno ricevuto da uno a tre precedenti regimi di trattamento sistemico - **Indicazione con innovatività**

Istruttoria: Coordinamento Regionale Attività Oncologiche (CRAO)

8.2. IMFINZI - durvalumab indicato in associazione a carboplatino e paclitaxel per il trattamento di prima linea di pazienti adulte con carcinoma dell'endometrio primario avanzato o recidivante che sono candidate



alla terapia sistemica, seguito dal trattamento di mantenimento con IMFINZI in monoterapia nel carcinoma dell'endometrio mismatch repair deficient (dMMR) - **Indicazione con innovatività**

Istruttoria: Coordinamento Regionale Attività Oncologiche (CRAO)

8.3. IMFINZI – durvalumab indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma polmonare a piccole cellule in stadio limitato (LS-SCLC) la cui malattia non è progredita a seguito di chemioradioterapia a base di platino - **Indicazione con innovatività**

Istruttoria: Coordinamento Regionale Attività Oncologiche (CRAO)

8.4. IMFINZI – durvalumab indicato in associazione a chemioterapia a base di platino come trattamento neoadiuvante, seguito da durvalumab in monoterapia come trattamento adiuvante, per il trattamento di pazienti adulti con NSCLC reseccabile ad alto rischio di recidiva e in assenza di mutazioni di EGFR (recettore del fattore di crescita dell'epidermide) o riarrangiamenti di ALK (chinasi del linfoma anaplastico).

Istruttoria: Coordinamento Regionale Attività Oncologiche (CRAO)

8.5. IMFINZI – durvalumab indicato in associazione a gemcitabina e cisplatino come trattamento neoadiuvante, seguito da durvalumab in monoterapia come trattamento adiuvante dopo la cistectomia radicale, per il trattamento di adulti con carcinoma della vescica muscolo invasivo (MIBC) reseccabile.

Istruttoria: Coordinamento Regionale Attività Oncologiche (CRAO)

9. Varie ed eventuali