

LUGLIO 2026

NET	NI	INDICAZIONE TERAPEUTICA OGGETTO DI VALUTAZIONE
TISOTUMAB VEDOTIN		In monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da cancro della cervice recidivato o metastatico con progressione della malattia durante o dopo la terapia sistemica.
MIRDAMETINIB		In monoterapia è indicato per il trattamento di neurofibromi plessiformi (PN, plexiform neurofibromas) sintomatici non operabili in pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a 2 anni, con neurofibromatosi di tipo 1 (NF1)
	TISLELIZUMAB	In associazione a chemioterapia contenente platino come trattamento neoadiuvante e poi continuato in monoterapia come trattamento adiuvante, è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da NSCLC resecabile ad alto rischio di recidiva.
	TISLELIZUMAB	In combinazione con etoposide e chemioterapia a base di platino è indicato per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con SCLC in stadio esteso.

AGOSTO 2026

NET	NI	INDICAZIONE TERAPEUTICA OGGETTO DI VALUTAZIONE
VIMSELTINIB		Trattamento di pazienti adulti con tumore tenosinoviale a cellule giganti (TGCT) sintomatico, associato a deterioramento clinicamente rilevante della funzionalità fisica e per i quali le opzioni chirurgiche sono state esaurite o indurrebbero morbidità o disabilità inaccettabili.
	TRASTUZUMAB DERUXTECAN	In monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con cancro della mammella positivo per i recettori ormonali (HR), HER2-low o HER2-ultralow non resecabile o metastatico, che hanno ricevuto almeno una terapia endocrina per malattia metastatica e che non sono considerati candidabili alla terapia endocrina quale linea di trattamento successiva.
	PEMBROLIZUMAB	Mesotelioma pleurico maligno (MPM): in combinazione con pemetrexed e chemioterapia a base di platino, è indicato per il trattamento di prima linea di adulti affetti da mesotelioma pleurico maligno non epitelioide non resecabile