

Commissione Tecnica Regionale Farmaci

Esito della seduta straordinaria in Teleconferenza del 26 agosto 2026

[illegible]



risposta o sono risultati intolleranti alla terapia convenzionale o a un trattamento biologico

3.5. OMVOH – mirikizumab indicato per il trattamento della malattia di Crohn moderata/grave (HBI HARVEY-BRADSHAW INDEX ≥ 8) in aggiunta o meno alla terapia convenzionale (aminosalicilati e/o steroidi e/o immunosoppressori), in presenza di almeno una delle seguenti situazioni cliniche: dipendenza da un trattamento con steroide per via sistemica, in presenza di resistenza, intolleranza o bilancio beneficio/rischio valutabile come negativo per gli immunosoppressori; resistenza o intolleranza/controindicazioni alla terapia steroidea orale

ALTRO

3.6. SPRAVATO – esketamina indicato in combinazione con una terapia antidepressiva orale, negli adulti di età compresa tra i 18 e i 65 anni di età, con un episodio da moderato a grave di disturbo depressivo maggiore (punteggio MADRS totale >28) senza manifestazioni psicotiche, come trattamento acuto di breve termine per la rapida riduzione dei sintomi depressivi, che in base al giudizio clinico costituiscono un'emergenza psichiatrica di entità tale da presentare una indicazione al ricovero.

3.7. JAKAVI – ruxolitinib indicato per il trattamento della malattia del trapianto contro l'ospite (Graft versus host disease, GvHD):

- GvHD acuta: trattamento di pazienti pediatrici di età pari o superiore ai 28 giorni ed inferiori ai 12 anni e di pazienti con difficoltà di deglutizione e/o gestione delle compresse con malattia del trapianto contro l'ospite acuta che presentano una risposta inadeguata al trattamento con corticosteroidi o altre terapie sistemiche;
- GvHD cronica: trattamento di pazienti pediatrici di età pari o superiore ai 6 mesi ed inferiori ai 12 anni e di pazienti con difficoltà di deglutizione e/o gestione delle compresse con malattia del trapianto contro l'ospite cronica che presentano una risposta inadeguata al trattamento con corticosteroidi o altre terapie sistemiche.

3.5. La CTRF conclude la valutazione

3.6. La CTRF conclude la valutazione

3.7. La CTRF rimanda la valutazione



4. Aggiornamento dell'elenco dei Centri Prescrittori dei farmaci per: - Trattamento malattie infiammatorie croniche intestinali – pazienti adulti e pediatrici; - HCV; - Deficit di lipasi acida lisosomiale (LAL); - Sindrome dell'intestino corto (SIC).	4. La CTRF conclude la valutazione
5. Varie ed eventuali Farmaci per il trattamento della colite ulcerosa: 5.1. SKYRIZI – risankizumab indicato per il trattamento di pazienti adulti con colite ulcerosa attiva di grado da moderato a severo, che hanno manifestato una risposta inadeguata, una perdita di risposta o un'intolleranza alla terapia convenzionale o a una terapia biologica 5.2. TREMFYA – guselkumab indicato per il trattamento di pazienti adulti con colite ulcerosa attiva di grado da moderato a severo che hanno avuto una risposta inadeguata, hanno perso la risposta o sono risultati intolleranti alla terapia convenzionale o a un trattamento biologico	5.1. La CTRF conclude la valutazione 5.2. La CTRF conclude la valutazione