

SETTEMBRE 2026

NET	NI	INDICAZIONE TERAPEUTICA OGGETTO DI VALUTAZIONE
	RETIFANLIMAB	In combinazione con carboplatino e paclitaxel per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con carcinoma a cellule squamose del canale anale (SCAC) metastatico o localmente recidivato non operabile.
	PEMBROLIZUMAB	Pembrolizumab, in associazione a pemetrexed e chemioterapia contenente platino, è indicato nel trattamento di prima linea di adulti affetti da mesotelioma maligno della pleura non epitelioide non resecabile.
	TRASTUZUMAB DERUXTECAN	In monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con cancro della mammella positivo per i recettori ormonali (HR), HER2-low o HER2-ultralow non resecabile o metastatico, che hanno ricevuto almeno una terapia endocrina per malattia metastatica e che non sono considerati candidabili alla terapia endocrina quale linea di trattamento successiva.

OTTOBRE 2026

NET	NI	INDICAZIONE TERAPEUTICA OGGETTO DI VALUTAZIONE
SUGEMALIMAB		Cancro del polmone non a piccole cellule (NSCLC) - in associazione a chemioterapia a base di platino è indicato per il trattamento di prima linea di adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) metastatico in assenza di mutazioni sensibilizzanti di EGFR o berrazioni dei geni ALK, ROS1 o RET del tumore.
	SELUMETINIB	NF1 – Neurofibromi plessiformi (adulti ≥ 3 anni) - è indicato per il trattamento dei neurofibromi plessiformi (NP) sintomatici non operabili nei pazienti con neurofibromatosi di tipo 1 (NF1) di età pari o superiore a 3 anni, inclusi gli adulti.
	CEMPIPLIMAB	CSCC ad alto rischio (trattamento adiuvante) - è indicato come trattamento adiuvante per i pazienti adulti con carcinoma squamocellulare cutaneo (CSCC) ad alto rischio dopo chirurgia radicale e radioterapia.