NOVEMBRE 2026

NET	NI	INDICAZIONE TERAPEUTICA OGGETTO DI VALUTAZIONE
	DURVALUMAB	Adenocarcinoma gastrico/GEJ resecabile - in associazione con chemioterapia FLOT in trattamento neoadiuvante e adiuvante, seguito da durvalumab in monoterapia come trattamento adiuvante, è indicato per il trattamento di pazienti adulti con adenocarcinoma gastrico o della giunzione gastroesofagea (GEJ) resecabile.
SUGEMALIMAB		Cancro del polmone non a piccole cellule (NSCLC) - in associazione a chemioterapia a base di platino è indicato per il trattamento di prima linea di adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) metastatico in assenza di mutazioni sensibilizzanti di EGFR o aberrazioni dei geni ALK, ROS1 o RET del tumore.
	IRINOTECAN LIPOSOMIALE PEGHILATO	Indicato in associazione con oxaliplatino, 5 fluorouracile (5 FU) e leucovorin nel trattamento di prima linea in pazienti adulti con adenocarcinoma metastatico del pancreas.

DICEMBRE 2026

NET	NI	INDICAZIONE TERAPEUTICA OGGETTO DI VALUTAZIONE
	SELPERCATINIB	Selpercatinib come monoterapia è indicato nel trattamento di adulti e pazienti pediatrici di età pari o superiore a 2 anni con cancro della tiroide avanzato RET fusione-positivo che sono refrattari allo iodio radioattivo (se lo iodio radioattivo è appropriato).
	PEMBROLIZUMAB	Carcinoma squamocellulare della testa e del collo localmente avanzato resecabile (neoadiuvante + adiuvante). Pembrolizumab è indicato, in associazione con chemioterapia a base di platino e radioterapia, come trattamento neoadiuvante seguito da trattamento adiuvante, per i pazienti adulti con carcinoma squamocellulare della testa e del collo (HNSCC) localmente avanzato resecabile il cui tumore esprime PD-L1 con un CPS ≥ 1.
	NIRAPARIB/ ABIRATERONE	Cancro prostatico metastatico ormono-sensibile (mHSPC) BRCA1/2 Niparaparib/abiraterone con prednisone o prednisolone in associazione con la terapia di deprivazione androgenica (ADT) per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma prostatico metastatico ormono-sensibile (mHSPC) e mutazioni BRCA1/2 (germinali e/o somatiche).

ELINZANETANT		Indicato per i sintomi vasomotori da moderati a severi, sia in menopausa sia causati dalla terapia endocrina adiuvante per il tumore al seno

GENNAIO 2027

NET	NI	INDICAZIONE TERAPEUTICA OGGETTO DI VALUTAZIONE
TARLATAMAB		Microcitoma polmonare in stadio esteso (ES-SCLC) - Tarlatamab è indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma polmonare a piccole cellule in stadio esteso (ES-SCLC) che necessitano di terapia sistemica dopo progressione di malattia durante o dopo il trattamento di prima linea con chemioterapia a base di platino.
	PEMBROLIZUMAB	Carcinoma della vescica muscolo-invasivo resecabile - Pembrolizumab, in associazione con enfortumab vedotin, come trattamento neoadiuvante e poi proseguito dopo cistectomia radicale come trattamento adiuvante, è indicato per il trattamento di adulti con carcinoma della vescica muscolo-invasivo (MIBC) resecabile non eleggibili a chemioterapia contenente cisplatino.
	SACITUZUMAB GOVITECAN	Carcinoma mammario triplo negativo – 1ª linea, non candidabile ad anti-PD-(L)1 - Sacituzumab govitecan è indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma mammario triplo negativo non resecabile, localmente avanzato o metastatico, che non hanno ricevuto una precedente terapia sistemica per la malattia metastatica e che non sono candidabili a terapia con inibitori di PD-1 o PD-L1.