La prevención es un gesto sencillo

Regione del Veneto

Servizio Socio Sanitario Regionale
In Universum Salus

VIVO BENE VENETO
Piano Regionale Prevenzione del Veneto

Programa de cribado del cáncer de cuello uterino

¿Qué es?

Es un programa gratuito para la prevención del cáncer de cuello uterino, que es la zona de unión entre la vagina y el útero. Este cáncer está causado por el virus del papiloma humano (VPH), un virus muy frecuente que se transmite por vía sexual. Existe una vacuna contra este virus, que se ofrece a niñas y niños a los 12 años y que es eficaz para prevenir la infección y el desarrollo de los tumores causados por el virus. El programa de cribado te acompaña desde el momento en que aceptas la invitación, pasando por el diagnóstico, hasta el tratamiento de una posible lesión.

Todo el proceso está cubierto por el Servicio Sanitario Regional. No necesitas receta médica.

¿A quién va dirigido?

Mujeres de 25 a 64 años, residentes o domiciliadas en la Región del Véneto.

¿Con qué frecuencia?

De 25 a 29 años: cada 3 años (con la prueba de Papanicolaou [Pap test]);

de 30 a 64 años: cada 5 años (con la prueba del VPH).

Las mujeres vacunadas contra el HPV antes de cumplir los 15 años comienzan el cribado a los 30 años porque presentan un riesgo muy bajo de desarrollar cáncer

¿Cómo se realiza?

La toma de una muestra del cuello uterino es una prueba que no causa dolor, aunque puede resultar un poco molesta, y dura pocos minutos.

No se realiza durante la menstruación: si tienes la regla el día de la cita, llama a tu ULSS para cambiarla.

El proceso

- Recibirás la invitación en tu domicilio y en la Historia Clínica Electrónica.
- También puedes cambiar la cita a través de la Historia Clínica Electrónica.
- ***Si el resultado es negativo:*** recibirás una comunicación de tu ULSS y, una vez transcurrido el intervalo programado, una nueva invitación.
- ***Si el resultado es positivo:*** recibirás una comunicación de tu ULSS y una invitación para realizar pruebas complementarias (consulta ginecológica con colposcopia). Si el resultado del VPH es positivo, pero la prueba de Papanicolaou (Pap test) realizada con la misma muestra es negativa, se te propondrá repetir la prueba del VPH al cabo de un año.

¿Por qué hacerlo?

El cribado puede detectar las lesiones antes de que se conviertan en un tumor, o detectar tumores cuando todavía son pequeños. De este modo, es más fácil tratarlos, con menos secuelas y mayores posibilidades de curación.

PARTICIPAR EN LOS PROGRAMAS DE CRIBADO ONCOLÓGICO ES MUY SENCILLO

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN Y SOLICITAR UNA CITA:
Contacta con tu ULSS a través de la **página web regional**

O accede a tu Historia Clínica Electrónica

Fascicolo Sanitario Elettronico
Sanità km zero