



Educazione Continua in Medicina

Scheda Evento

Denominazione Provider FONDAZIONE SPERANZA ONLUS

Titolo La riabilitazione dell'arto superiore nelle patologie neuromuscolari

ID Evento 104-241120

Tipologia Evento RES

Data Inizio 26/11/2021

Data Fine 26/11/2021

Date Intermedie

Durata 04:00

Professioni / Discipline	Partecipanti senza obbligo ECM	
	Partecipanti senza obbligo ECM	Partecipanti senza obbligo ECM
Fisioterapista	Fisioterapista	
Infermiere	Infermiere	
Logopedista	Logopedista	
Medico chirurgo	Medicina fisica e riabilitazione	Neurologia
Partecipanti senza obbligo ECM	Partecipanti senza obbligo ECM	
Psicologo	Psicologia	
Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva	Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva	

Numero partecipanti 15

Obiettivo Strategico Nazionale (18) Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica ivi, incluse le malattie rare e la medicina di genere

Obiettivo Strategico Regionale (6) Approccio integrato e multidisciplinare nei diversi luoghi di presa in carico, cura e riabilitazione (percorsi assistenziali, modelli organizzativi, PDTA, ecc.)

Costo 0.00

Crediti 5.2

Responsabili Scientifici	Nome	Cognome	Qualifica
		DOMENICO	DE GRANDIS

Docente/ Relatore/	Nome	Cognome	Ruolo	Titolare/Sostituto

Tutor	DOMENICO	DE GRANDIS	DOCENTE	titolare
	MARIA VITTORIA	BENETTI	DOCENTE	titolare
	GIANNA	SANTUS	DOCENTE	titolare
	GORAN	SIMEONOVIC	DOCENTE	titolare
	CHIARA	RIGHETTI	DOCENTE	titolare
	ANDREA	GUERRINI	DOCENTE	titolare

Verifica
Apprendimento Questionario (test)

Segreteria
Organizzativa

Nome	Cognome	Email	Telefono	Cellulare

Programma

Razionale Il corso "La riabilitazione dell'arto superiore nelle patologie neuromuscolari " ha l'obiettivo di fornire ai partecipanti un inquadramento ed una conoscenza specifica delle principali patologie della spalla, mediante il riconoscimento delle caratteristiche cliniche che le contraddistinguono. Durante il corso verranno proposti casi clinici per evidenziare le caratteristiche presenti in ogni singola disfunzione e la possibile concomitanza con le malattie neuromuscolari. L'aspetto teorico sarà abbinato alla parte dimostrativa in modo da poter rendere più concreti gli argomenti precedentemente discussi. L'obiettivo è l'apprendimento da parte del terapeuta, che segue un paziente con patologie croniche, di avere elementi fondamentali per riconoscere la sovrapposizione al deficit di base, di complicanze alla spalla, secondarie alla ridotta motilità o alla debolezza localizzata. La presentazione di casi clinici metterà in evidenza l'approccio al trattamento e la modifica del piano terapeutico da concordare con il fisiatra prescrittore

Risultati attesi Le complicanze che coinvolgono l'articolazione scapolo omerale risultano molto frequenti nel decorso di malattie neuromuscolari. Queste possono insorgere per traumi frequenti in seguito a cadute, sovraccarichi, sia da compenso che in seguito a mobilizzazioni del paziente e frequentemente come conseguenza della riduzione della motilità per la paresi. La sintomatologia dolorosa della spalla può, in alcuni casi, precedere il riconoscimento diagnostico della malattia neuromuscolare. Molto più frequentemente la patologia è una conseguenza della ridotta motilità dell'arto superiore e va prevenuta..
La manifestazione clinica più frequente è il dolore seguito da una limitata mobilità che si sovrappone alla sintomatologia deficitaria alla base del quadro clinico. Il terapeuta può incontrare questa complicanza in qualsiasi fase del trattamento. Di conseguenza dovrà cercare di modificare il progetto terapeutico con l'obiettivo di non danneggiare ulteriormente la spalla e di inserire negli obiettivi l'ideale terapia per il dolore e la prevenzione delle limitazioni di motilità.

Programma del 26/11/2021

Provincia Sede VERONA

Comune Sede VERONA

Indirizzo Sede via A. Berardi 51, Verona

Luogo Sede Centro ambulatoriale di riabilitazione - sala Guglielmo

Dettaglio Attività

Ora Inizio	Ora Fine	Argomento	Docente/ Tutor	Risultato Atteso	Obiettivi Formativi	Metodologia Didattica
14:15	14:30	REGISTRAZIONE PARTECIPANTI				

14:30	15:10	Fisiopatologia della spalla	SANTUS	<p>Le complicanze che coinvolgono l'articolazione scapolo omerale risultano molto frequenti nel decorso di malattie neuromuscolari. Queste possono insorgere per traumi frequenti in seguito a cadute, sovraccarichi, sia da compenso che in seguito a mobilizzazioni del paziente e frequentemente come conseguenza della riduzione della motilità per la paresi. La sintomatologia dolorosa della spalla può, in alcuni casi, precedere il riconoscimento diagnostico della malattia neuromuscolare. Molto più frequentemente la patologia è una conseguenza della ridotta motilità dell'arto superiore e va prevenuta..</p> <p>La manifestazione clinica più frequente è il dolore seguito da una limitata mobilità che si sovrappone alla sintomatologia deficitaria alla base del quadro clinico. Il terapeuta può incontrare questa complicanza in qualsiasi fase del trattamento. Di conseguenza dovrà cercare di modificare il progetto terapeutico con l'obiettivo di non danneggiare ulteriormente la spalla e di inserire negli obiettivi l'ideale terapia per il dolore e la prevenzione delle limitazioni di motilità.</p>	Acquisire conoscenze teoriche e/o pratiche	Lezione Frontale/Relazione (metodologia frontale)
15:10	15:50	Muscoli e nervi	DE GRANDIS	<p>Le complicanze che coinvolgono l'articolazione scapolo omerale risultano molto frequenti nel decorso di malattie neuromuscolari. Queste possono insorgere per traumi frequenti in seguito a cadute, sovraccarichi, sia da compenso che in seguito a mobilizzazioni del paziente e frequentemente come conseguenza della riduzione della motilità per la paresi. La sintomatologia dolorosa della spalla può, in alcuni casi, precedere il riconoscimento diagnostico della malattia neuromuscolare. Molto più frequentemente la patologia è una conseguenza della ridotta motilità dell'arto superiore e va prevenuta..</p> <p>La manifestazione clinica</p>	Acquisire conoscenze teoriche e/o pratiche	Lezione Frontale/Relazione (metodologia frontale)

				<p>più frequente è il dolore seguito da una limitata mobilità che si sovrappone alla sintomatologia deficitaria alla base del quadro clinico. Il terapeuta può incontrare questa complicanza in qualsiasi fase del trattamento. Di conseguenza dovrà cercare di modificare il progetto terapeutico con l'obiettivo di non danneggiare ulteriormente la spalla e di inserire negli obiettivi l'ideale terapia per il dolore e la prevenzione delle limitazioni di motilità.</p>		
15:50	16:30	Ecografia	GUERRINI	<p>Le complicanze che coinvolgono l'articolazione scapolo omerale risultano molto frequenti nel decorso di malattie neuromuscolari. Queste possono insorgere per traumi frequenti in seguito a cadute, sovraccarichi, sia da compenso che in seguito a mobilizzazioni del paziente e frequentemente come conseguenza della riduzione della motilità per la paresi. La sintomatologia dolorosa della spalla può, in alcuni casi, precedere il riconoscimento diagnostico della malattia neuromuscolare. Molto più frequentemente la patologia è una conseguenza della ridotta motilità dell'arto superiore e va prevenuta..</p> <p>La manifestazione clinica più frequente è il dolore seguito da una limitata mobilità che si sovrappone alla sintomatologia deficitaria alla base del quadro clinico. Il terapeuta può incontrare questa complicanza in qualsiasi fase del trattamento. Di conseguenza dovrà cercare di modificare il progetto terapeutico con l'obiettivo di non danneggiare ulteriormente la spalla e di inserire negli obiettivi l'ideale terapia per il dolore e la prevenzione delle limitazioni di motilità.</p>	Acquisire conoscenze teoriche e/o pratiche	Lezione Frontale/Relazione (metodologia frontale)
16:30	17:10	La riabilitazione	SANTUS	<p>Le complicanze che coinvolgono l'articolazione scapolo omerale risultano molto frequenti nel decorso di malattie neuromuscolari. Queste possono insorgere per traumi frequenti in seguito a cadute, sovraccarichi, sia da compenso che in seguito a</p>	Acquisire conoscenze teoriche e/o pratiche	Lezione Frontale/Relazione (metodologia frontale)

				<p>mobilizzazioni del paziente e frequentemente come conseguenza della riduzione della motilità per la paresi. La sintomatologia dolorosa della spalla può, in alcuni casi, precedere il riconoscimento diagnostico della malattia neuromuscolare. Molto più frequentemente la patologia è una conseguenza della ridotta motilità dell'arto superiore e va prevenuta..</p> <p>La manifestazione clinica più frequente è il dolore seguito da una limitata mobilità che si sovrappone alla sintomatologia deficitaria alla base del quadro clinico. Il terapista può incontrare questa complicanza in qualsiasi fase del trattamento. Di conseguenza dovrà cercare di modificare il progetto terapeutico con l'obiettivo di non danneggiare ulteriormente la spalla e di inserire negli obiettivi l'idonea terapia per il dolore e la prevenzione delle limitazioni di motilità.</p>		
17:10	17:50	Terapie fisiche	BENETTI	<p>Le complicanze che coinvolgono l'articolazione scapolo omerale risultano molto frequenti nel decorso di malattie neuromuscolari. Queste possono insorgere per traumi frequenti in seguito a cadute, sovraccarichi, sia da compenso che in seguito a mobilizzazioni del paziente e frequentemente come conseguenza della riduzione della motilità per la paresi. La sintomatologia dolorosa della spalla può, in alcuni casi, precedere il riconoscimento diagnostico della malattia neuromuscolare. Molto più frequentemente la patologia è una conseguenza della ridotta motilità dell'arto superiore e va prevenuta..</p> <p>La manifestazione clinica più frequente è il dolore seguito da una limitata mobilità che si sovrappone alla sintomatologia deficitaria alla base del quadro clinico. Il terapista può incontrare questa complicanza in qualsiasi fase del trattamento. Di conseguenza dovrà cercare di modificare il progetto terapeutico con</p>	Acquisire conoscenze teoriche e/o pratiche	Lezione Frontale/Relazione (metodologia frontale)

				l'obiettivo di non danneggiare ulteriormente la spalla e di inserire negli obiettivi l'idonea terapia per il dolore e la prevenzione delle limitazioni di motilità.		
17:50	18:10	Casi clinici	RIGHETTI	<p>Le complicanze che coinvolgono l'articolazione scapolo omerale risultano molto frequenti nel decorso di malattie neuromuscolari. Queste possono insorgere per traumi frequenti in seguito a cadute, sovraccarichi, sia da compenso che in seguito a mobilizzazioni del paziente e frequentemente come conseguenza della riduzione della motilità per la paresi. La sintomatologia dolorosa della spalla può, in alcuni casi, precedere il riconoscimento diagnostico della malattia neuromuscolare. Molto più frequentemente la patologia è una conseguenza della ridotta motilità dell'arto superiore e va prevenuta..</p> <p>La manifestazione clinica più frequente è il dolore seguito da una limitata mobilità che si sovrappone alla sintomatologia deficitaria alla base del quadro clinico. Il terapeuta può incontrare questa complicanza in qualsiasi fase del trattamento. Di conseguenza dovrà cercare di modificare il progetto terapeutico con l'obiettivo di non danneggiare ulteriormente la spalla e di inserire negli obiettivi l'idonea terapia per il dolore e la prevenzione delle limitazioni di motilità.</p>	Acquisire competenze per l'analisi e la risoluzione di problemi	Presentazione e discussione di problemi o di casi didattici in grande gruppo (metodologia interattiva)
18:10	18:30	Casi clinici	SIMEONOVIC	<p>Le complicanze che coinvolgono l'articolazione scapolo omerale risultano molto frequenti nel decorso di malattie neuromuscolari. Queste possono insorgere per traumi frequenti in seguito a cadute, sovraccarichi, sia da compenso che in seguito a mobilizzazioni del paziente e frequentemente come conseguenza della riduzione della motilità per la paresi. La sintomatologia dolorosa della spalla può, in alcuni casi, precedere il riconoscimento diagnostico della malattia neuromuscolare. Molto più frequentemente la</p>	Acquisire competenze per l'analisi e la risoluzione di problemi	Presentazione e discussione di problemi o di casi didattici in grande gruppo (metodologia interattiva)

				<p>patologia è una conseguenza della ridotta motilità dell'arto superiore e va prevenuta..</p> <p>La manifestazione clinica più frequente è il dolore seguito da una limitata mobilità che si sovrappone alla sintomatologia deficitaria alla base del quadro clinico. Il terapeuta può incontrare questa complicanza in qualsiasi fase del trattamento. Di conseguenza dovrà cercare di modificare il progetto terapeutico con l'obiettivo di non danneggiare ulteriormente la spalla e di inserire negli obiettivi l'ideale terapia per il dolore e la prevenzione delle limitazioni di motilità.</p>		
18:30	18:50	VALUTAZIONE APPRENDIMENTO				